

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>Blütenstauden</b>								
<b>A c a e n a</b> (Stachelnüsschen)	A. microphylla	So/mager, trocken bis frisch	5	VII	weiß, stachlig, kugelig	rötlich, gefiedert	kriechende Triebe	2
<b>A c a n t h u s</b> (Akanthus)	A. hungaricus	So-Hs/relativ trocken	80	VI-VIII	stumpf-lila, ährenförmiger Blütenstand	langgestreckt, fiederspaltig	dekorativ	3
<b>A c h i l l e a</b> (Schafgarbe)	A. Hybr. 'Coronation Gold'	So/trocken	70	VI-VIII	goldgelbe Dolde	fiederschnittig, grau-grün	horstig	3
	A. Hybr. 'Goldplatte'	So/trocken	140	VI-IX	sattgelbe Dolde	fiederschnittig, hellgrün	horstig	3
	A. millefolium	So/trocken	70	VI-VIII	rosarote Dolde	fiederschnittig, dunkelgrün	leicht kriechend	2
	A. ptarmica 'Perle'	So-Hs/frisch	50	VI-IX	teilweise weiß gefüllt	lanzettlich	kriechend	2
<b>A c o n i t u m</b> (Eisenhut)	A. henryi 'Spark'	Hs/frisch	180	VII-VIII	dunkelblaue breite Rispe	handförmig geteilt	rübenförmige Wurzelknolle	3
	A. napellus 'Stanless Steel'	Hs/frisch	120	VII	graublau schmale Rispe	handförmig geteilt	rübenförmige Wurzelknolle	3
<b>A c o n o g o n o n</b> (Knöterich)	A. x fennicum 'Johanniswolke'	So/anspruchlos	200	VI-VIII	cremeweiße Rispen	dunkelgrün, breitoval, zugespitzt	horstartig, standfest	5
<b>A d e n o p h o r a</b> (Schellenblume)	A. confusa (?)	Hs/frisch	40	VI-VIII	blau, glockenblumenähnlich	breit-oval, gezähnt	kurze Ausläufer	3
<b>A e g o p o d i u m</b> (Giersch)	A. podagraria 'Variegata'	So-Hs/frisch	50	V-VI	weiße Dolden	weißbunt, breitoval, gezähnt	wuchert schwächer als die Art	2
<b>A g a s t a c h e</b> (Duftnessel)	A. foeniculum	So/trocken	70	VII-IX	violett-blaue Scheinähren	breit-oval, gezähnt, Anis-Duft	kurzlebig, Selbstaussaat	2
<b>A g e r a t i n a</b> (Ageratumdost)	A. altissima	So-Hs/trocken-frisch	100	VIII-IX	weiße Dolden	kreuzgegenständig, scharf gezähnt	horstig, anspruchslos	3
	A. altissima 'Chocolate'	So-Hs/trocken-frisch	80	X	weiße Dolden	violett-braun	horstig, spätaustreibend	4
<b>A g r i m o n i a</b> (Odermennig)	A. eupatoria	So/trocken-frisch, nährstoffreich	70	VI-VIII	gelbe kleine Blü im oberen Stängelbereich	unpaarig gefiedert	horstig, langlebig	2

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5 = 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>A j u g a</b> (Günsel)	A. reptans 'Atropurpurea'	So-Hs/frisch	20	V	violett-blaue Ähren	violett-braun, eiförmig, glänzend	unsteter Bodendecker	1
<b>A l c e a</b> (Stockrose)	A. rosea	So/tiefgründig	180	VI-IX	rot	rundlich, runzlig	steht gut in Hausnähe, kurzlebig	2
	A. rugosa	So/trocken	180	VI-IX	hellgelb	fünflappig	relativ langlebig	2
<b>A l c h e m i l l a</b> (Frauenmantel)	A. alpina	So/kalkmeidend	20	VI-X	gelbgrüne kleine Rispen	5- bis 7-teilig, unterseits weiß	lockerhorstig	2
	A. erythropoda (caucasica)	So/mager	10	IV-VI	grüngelbe kleine Rispen	rundlich, faltig, grau-grün	lockerhorstig, zierlich, rötliche Blattstiele	2
	A. mollis	So-Hs/frisch	50	VI-VIII	hellgelbe große Rispen	hellgrün, rundlich, gefaltet	Selbstaussaat, lockerhorstig	2
	A. vulgaris	So-Hs/anspruchlos	15	V-X	gelbgrüne kleine Rispen	stumpf-grün, gefaltet, rundlich	lockerer Wuchs, Heilpflanze	2
<b>A l l i u m</b> (Lauch)	A. cyaneum	So/durchlässig	15	VIII	kleine blaue Kugeln	grasartig	für den Steingarten (Enzianlauch)	2
	A. fistulosum	So/guter Gartenboden	50	VI-VIII	weiße Einzelblüten in einer kugeligen Dolde	hohl, röhrenförmig	früh austreibend, wie Schnittlauch zu verwenden	2
	A. schoenoprasum <b>Schnittlauch</b>	So/eher frisch	30	VI	violette kugelige Dolde	hohl, röhrenförmig		2
	A. tuberosum <b>Schnittknoblauch</b>	So-Hs/anspruchlos	40	VIII-X	weiße Blütendolden	platt und fest	Blüten duften	2
	A. ursinum <b>Bärlauch</b>	Hs/frisch, humos	30	IV-V	weiße Blütendolden	frischgrün, breit elliptisch	zieht nach der Blüte ein	2
<b>A l t h a e a</b> (Eibisch)	A. cannabina	So/anspruchlos	180	VII-IX	rosalila	3- bis 5- lappig, rau behaart	vieltriebige Staude, wirkt grazios, horstig	3
	A. officinalis	So/frisch-trocken	200	VII-IX	fast weiß, malvenartig	3- bis 5- lappig, filzig	filzige Stängel, vieltriebige Großstaude, horstig	3
<b>A l y s s u m</b> (Steinkraut)	A. murale (argenteum)	So/trocken	30	V-VII	gelbe Doldentrauben	graugrün, lanzettlich, kurz, rau	Triebe drahtig	2
	A. saxatile	siehe Aurinia saxatilis						

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
Alyssum	A. wulfenianum	So/kalkliebend	15	IV-V	gelbe Doldentrauben	klein, oval, hellgrau	niederliegende Triebe	2
<b>A m o r p h a (Bleibusch)</b>	A. canescens	So/trocken	70	VI-VII	blauviolette Blütchen in einer Ähre	gefiedert und zart	Halbstrauch	3
<b>A m s o n i a (Westlicher Röhrenstern)</b>	A. tabernaemontana	So	70	V-VI	hellblaue Blütendolde	mattgrün, eiförmig	horstiger Wuchs, gelbe Herbstfärbung	4
<b>A n a p h a l i s (Silberimmortelle)</b>	A. triplinervis	So/durchlässig, nicht zu trocken	25	VII-VIII	weiße Doldentraube	oberseits grau, unterseits weißwollig	horstartig, aufrecht	3
	A. triplinervis var. intermedia	So/durchlässig, nicht zu trocken	30	VII	weiße Doldentraube	oberseits grau unterseits weißwollig	horstiger Wuchs, Blütentriebe eher lagernd	3
<b>A n e m o n e (Anemone)</b>	A. x hybrida 'Hadspen Abundance'	Hs/frisch	50	IX	6 Blütenblätter abwechseln hell- und dklpurpur	dreifach geteilt und gestielt	Wurzelausläufer, spätaustreibend	3
	A. x hybrida 'Prinz Heinrich'	Hs/frisch	60	IX	purpurrot, halbgefüllt	dreifach geteilt und gestielt	Wurzelausläufer, spätaustreibend	3
	A. sylvestris	So-Hs/trocken, warm, kalkhaltig	20	V-VI	weiß, einfach	langgestielte 2 bis 6-teilige Blätter	Wurzelkriecher	3
	A. tomentosa 'Serenade'	Hs/frisch	100	VIII-IX	rosa, einfach	dreifach geteilt und gestielt	Wurzelausläufer	3
	A. tomentosa 'Robustissima'	Hs/frisch	80	VII-VIII	hellrosa, einfach	dreifach geteilt und gestielt	Wurzelausläufer	3
	A. virginiana	Hs/trocken	80	VI-VIII	grünlich weiß, zylindrischer Blütenboden		horstartig, Selbstaussaat	2
<b>A n g e l i c a (Engelwurz)</b>	A. archangelica	So/frisch	200	VII-VIII	weiße Doldenblüten	groß, fiederschnittig	kurzlebig, Selbstaussaat	2
<b>A n t e n n a r i a (Katzenpfötchen)</b>	A. dioica	So/trocken, sandig	10	V-VI	rosa Döldchen	grau, schmal	Matten bildend	3
<b>A n t h e m i s (Hundskamille)</b>	A. tinctoria	So/trocken	60	VII-IX	goldgelbe Margeritenblüten	fiederteilig	kurzlebig aber selbstaussäend	2
<b>A n t h e r i c u m (Graslilie)</b>	A. liliago	So/trocken, kalkarm, humoser Sand	50	V-VI	weiß in einer Traube (unverzweigt)	grasartig, grundständig in Rosetten	horstig	3

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>Anthericum</b>	A. ramosum	So/trocken, kalkliebend, lehmigsteinig	80	VII	weiß, Rispe aus mehreren Trauben (Blütenstand verzweigt)	grasartig, grundständig in Rosetten	horstig	3
<b>Aquilegia (Akelei)</b>	A. vulgaris	So-Hs/anspruchlos	60	VI-VII	verschiedene Farben	dreifach dreiteilige Blätter	kurze Blütensporne, nach innen gekrümmt	2
<b>Arabis (Gänsekresse)</b>	A. caucasica 'Plena'	So/durchlässig	15	IV-V	weiß gefüllt, in großen Trauben	graufilzig, spatelförmig, wenig gezähnt	polsterbildend	2
	A. procurrens	So-Hs/anspruchlos	15	V	weiß in kleinen Trauben	glänzend grün	wintergrüne Blattrosetten	2
<b>Armeria (Grasnelke)</b>	A. maritima	So/trocken-frisch	15	V-VI	weiß, rot	kurz, grasartig	Salzwiesenpflanze	2
<b>Artemisia (Beifuß/Raute/Wermut)</b>	A. abrotanum <b>Eberraute</b>	So/trocken	100	VII-X	blaßgelb, unscheinbar in einer langen Rispe	grün, fein zerteilt	Halbstrauch, Blätter duften nach Zitrone	3
	A. absinthium <b>Wermut</b>	So/trocken, nährstoffreich	100	VII-IX	hellgelbe Blütenrispen	silbrig, fiederschnittig	horstig wachsend, wenig verholzend	2
	A. alba <b>Kampferraute</b>	So/trocken	100	VII-IX	hellgelb in Rispen	graugrün, fein zerteilt	Halbstrauch, duftet nach Kampfer	3
	A. dracunculus <b>Estragon</b>	So/kühl-frisch	80	VIII-IX	zartweiß in langen Rispen	grün, lanzettlich	unterirdische Ausläufer	3
<b>Arum (Aronstab)</b>	A. italicum	Hs/eher trocken	30	V-VI	Kolben dunkelgelb, Spatha hellgrün	spießförmig, weiße Adern, wintergrün	ab August orangerote giftige Früchte, Laub im Sommer einziehend,	3
<b>Arunca (Geißbart)</b>	A. aethusifolius	Hs/trocken bis frisch	25	VI-VII	weiße Blütenrispen	farnartig	bildet kleine Matten	3
	A. dioicus (sinensis)	So-Hs/trocken-frisch	180	VI-VII	cremeweiße Blütenrispen	2- 3fach gefiedert	langlebige Großstaude, horstig	3
	A. dioicus 'Horatio'	So-Hs/trocken-frisch	80	VI-VII	weiße Blütenrispen	2- 3fach gefiedert	Stängel rötlich, Blütenstände weibliche Form	5
<b>Asarum (Haselwurz)</b>	A. europaeum	Hs-S/trocken-frisch, humos	10	IV-V	braunrote Blüten mit nach innen geneigten Zipfeln unter dem Laub	nierenförmig, glänzend grün	langsam kriechend, immergrün	3

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5 = 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>Asclepias (Seidenpflanze)</b>	A. syriaca	So/anspruchlos	150	VI-VIII	matt purpur, doldig aus den oberen Blattachseln	quirlig angeordnet, eilänglich	kriechendes Rhizom, unverzweigte Stängel	5
<b>Asphodeline (Junkerlilie)</b>	A. liburnica	So/durchlässig	60	VII-VIII	grünlich-gelb in einer grazilen Rispe	linealische Blätter in grundständiger Rosette, hellgrün	kurze Ausläufer, im Sommer einziehend, im Winter grün	5
	A. lutea	So/durchlässig	100	V-VI	gelb in einer Traube	linealische bläuliche Blätter in grundständiger Rosette	kurze Ausläufer, im Sommer einziehend, im Winter grün	5
<b>Aster (Aster)</b>	A. ageratoides 'Adustus Nanus'	So/kann trocken	20	VII-IX	hell-lila in Doldenrispen	oval zugespitzt, etwas gesägt	niedrige robuste flächendeckende Aster	3
	A. ageratoides 'Asran'	So/kann trocken	70	X	hell-violett in Doldenrispen	oval zugespitzt, etwas gesägt	kräftige unterirdische Ausläufer, für schlechte Plätze	3
	A. x amethystinus 'Schneetanne'	So/trocken-frisch, nährstoffreich	100	X	weiß kleinblütig in aufrechter Rispe	lineal-lanzettlich, rau	relativ horstig wachsend	3
	A. x amethystinus 'Freiburg'	So/trocken-frisch, nährstoffreich	100	X	blau kleinblütig in aufrechter Rispe	lineal-lanzettlich, rau	relativ horstig wachsend	3
	A. x amethystinus 'Kylie'	So/normal, nährstoffreich	100	IX	rosa kleinblütig in breiter Doldenrispe	lineal-lanzettlich, rau	kurze Ausläufer, breit überhängend	3
	A. cordifolius 'Ideal'	So/normal	90	IX-X	hellblaue überhängende Blütenrispen	grundständige B. sind herzförmig	horstartig, Stängel sind stark verzweigt	3
	A. divaricatus ( <b>Wald-Aster</b> )	So-Hs/trocken	40	VIII-IX	weiße Blütchen, Kelchblätter wie silbrige Sternchen im Winter	dunkelgrüne eilanzettliche Blätter mit scharfen Zähnen	robuste wenig kriechende Aster, schwärzlicher Stängel	3
<b>(Kissenaster)</b>	A. dumosus -H. 'Blaue Lagune'	So/normal, nährstoffreich	40	VIII-IX	blau, locker pyramidal	dunkelgrün, glatt, ganzrandig	flächig wachsend	3
	A. dumosus-H. 'Prof. A. Kippenberg'	So/normal, nährstoffreich	30	IX	blau, locker, pyramidal	dunkelgrün, glatt, ganzrandig	Ausläufer	3
	A. dumosus-H. 'Silberblaukissen'	So/normal, nährstoffreich	20	VIII-IX	hellblau, locker pyramidal	dunkelgrün, glatt, ganzrandig	Ausläufer	3
<b>(Myrthenaster)</b>	A. ericoides	So/normal, nährstoffreich	90	IX	cremeweiße Blütchen in ausgespreizter Rispe	lineal-lanzettlich, dunkelgrün	Ausläufer, aufrechter Wuchs	3

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
Aster	A. ericoides ssp. panicus 'Snowflurry'	So/anspruchlos	15	X	kleine weiße Blüten	linealisch, rau	kriechend, überhängende Triebe	3
	A. glehnii 'Aglehni'	So/frisch, nährstoffreich	150	VIII-X	weiß in dichter Doldentraube	länglich, etwas gezähnt	kurze Ausläufer, standfest, üppig	4
	A. laevis	So/normal	80	IX	hellblau in lockertraubig zusammengesetzter Rispe	oval zugespitzt, glatt	horstig wachsend	3
	A. laevis 'Calliope'	So/trocken-frisch, nährstoffreich	120	IX-X	blau, relativ großblumig	sehr dunkle Blätter, oval zugespitzt	Ausläufer	3
	A. laterifolius 'Coombe Fishacre'	So/frisch, nährstoffreich	70	VIII-IX	rosa-lila, kleinblütig, in den Blattachsen der Seitenzweige	lineal-lanzettlich, fein gesägt	horstig, kompakter Wuchs	3
	A. macrophyllus 'Twilight'	Hs/trocken-frisch	70	VII-VIII	blau, doldenartig	oval zugespitzt	kurze Ausläufer	3
<b>(Raublattaster)</b>	A. n.-a. 'Alma Pötschke'	So/trocken-frisch	100	IX	dunkel lachsrot, dicht verzweigt	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	horstig	3
	A. n.a. 'Barrs Blue'	So/trocken-frisch	100	X	blau, dicht verzweigt	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	spät blühend, horstig	3
	A. n.a. 'Pierrot'	So/trocken-frisch	80	VIII-IX	rosa, dicht verzweigt	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	horstig	3
	A. n.a. 'Rubinschatz'	So/trocken-frisch	120	VIII-IX	dunkel-rubinrot	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	horstig, relativ standfest	3
	A. n.a. 'Violetta'	So/trocken-frisch	80	VIII-IX	blauviolett	lanzettlich, halb stängelumfassend, rau	früh blühend	3
<b>(Glattblattaster)</b>	A. novi-belgii 'Schöne von Dietlicon'	So/frisch, nährstoffreich	100	VIII-IX	blauviolett, doldenrispig	dunkelgrün, glatt, halb stängelumfassend	kriechender Wurzelstock	4
	A. pringlei 'Pink Star'	So/trocken-frisch	90	IX	rosa feinstrahlig in pyramidalen Rispen	schmal-linealisch	horstig, aufrecht	3
<b>Aster</b>	A. schreberi	Hs/trocken-frisch	70	VII-VIII	weiße Blüten, Kelchblätter im Winter silbrig	groß, decken gut den Boden	kurze Ausläufer	3

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
	A. tataricus	So/normal	150	XI	lilablau, Doldenrispen	breit-oval und lang	standfest, kurze Ausläufer	3
<b>(Prärieaster)</b>	A. turbinellus	So/trocken	90	VIII-IX	hellblau, lockerer Blütenstand	lanzettlich, ganzrandig	horstartig	3
	A. umbellatus	So/frisch	150	VII-IX	cremeweiß in lockerer Doldentraube	breit lanzettlich, kurz gestielt	Ausläufer, standfest	3
<b>Astilbe (Prachtspiere)</b>	x arendsii 'Amethyst'	Hs/frisch, nährstoffreich	80	VII	lilarosa, rispiger Blütenstand	2- 3fach gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3
	x arendsii 'Brautschleier'	Hs/frisch, nährstoffreich	60	VII	weiß, fedrige Rispe	2- 3fach gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3
	x arendsii 'Bressingham Beauty'	Hs/frisch, nährstoffreich	100	VII-VIII	leuchtend rosa, fedrige Rispe	2- 3fach gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3
	x arendsii 'Cattleya'	Hs/frisch, nährstoffreich	60	VII	lilarosa, fedrige Rispe	2- 3fach gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3
	x arendsii 'Else Schluck'	Hs/frisch, nährstoffreich	60	VII	karminrot, fedrige Rispe	2- 3fach gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3
	chinensis var. pumila	So-Hs/trockenfrisch	25	VII-VIII	lilarosa, fedrige Rispe	2 -3fach gefiedert	robust, leicht kriechender Wuchs	3
	chinensis var. pumila 'Veronika Klose'	So-Hs/trockenfrisch	40	VIII-IX	dunkelrosa, fedrige Rispe	2 -3fach gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3
	simplicifolia 'Henny Graafland'	Hs-S/kühl, frisch	30	VII	rosa, fedrige Rispe	glänzend grün, 2 -3fach gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3
<b>Astilboides (Tafelblatt)</b>	tabularis	Hs/frisch, kühl	100	VI	weiße Rispe	sehr große Blätter, rund, langgestielt, borstig behaart	Wurzelstock dick, langsam kriechend	6
<b>Astrantia (Sterndolde)</b>	major	So-Hs/frisch, nährstoffreich	60	VI-VIII	grünlich weiß, papierartig	handförmig eingeschnitten	horstartig	4
	major 'Hadspen Blood'	So-Hs/frisch, nährstoffreich	70	VI-VIII	rot, großblumig	handförmig eingeschnitten	horstig	4
<b>Astrantia</b>	major 'Ruby Wedding'	So-Hs/frisch, nährstoffreich	40	VI-VIII	rot	dunkles Laub	horstig	4

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5 = 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>A s y n e u m a</b> (Traubenrapunzel)	canescens	So/trocken, mager	70	VII-VIII	blauviolette Rispen	lanzettliche Blätter	horstig, auf Steppenwiesen	3
<b>A u b r i e t a</b> (Blaukissen)	x cultorum 'Blaumeise'	So/trocken, mager	10	IV-V	blau	Rosetten aus kleinen graugrünen spatelförmigen Blättern	immergrüne Polsterpflanze	2
	x cultorum 'Neuling'	So/trocken, mager	10	IV-V	hellblau	siehe oben	immergrüne Polsterpflanze	2
	x cultorum 'Red Dyke'	S0/trocken, mager	10	IV-V	rot	siehe oben	immergrüne Polsterpflanze	2
<b>A u r i n i a</b> (Felsensteinkraut)	saxatilis	So/trocken	30	V	gelb in rispigen Trauben	grau, länglich	Halbstrauch, nach der Blüte zurückschneiden	2
<b>A z o r e l l a</b> (Andenpolster)	trifurcata	So-Hs/kühl, frisch	5	VII	grüngelb, unscheinbar	Rosettchen aus geteilten harten Blättern	gut geeignet für Plattenfügen	3
<b>B a p t i s i a</b> (Färberhülse)	australis	So-Hs/frisch, lehmig, steinig	80	VI-VIII	blau, ähnlich Lupinen	3teilig und oval	horstig, entwickelt sich langsam	3
<b>B e r g e n i a</b> (Bergenie)	-Hybride 'Admiral'	So-Hs/trockenfrisch	40	IV-V	purpur in einer Trugdolde	groß, einfach, ledrig, grün	robust, flach kriechendes Rhizom, immergrün	3
	- H. 'Biedermeier'	So-Hs/trockenfrisch	40	IV-V	hellrosa in einer Trugdolde	groß, einfach, ledrig	robust, flach kriechendes Rhizom, immergrün	3
	- H. 'Eroica'	So-Hs/trockenfrisch	50	IV-V	purpur-violett in einer Trugdolde	groß, einfach, ledrig, grün	Blätter färben sich im Winter rot	3
	- H. 'Schneekuppe'	So-Hs/trockenfrisch	40	IV-V	weiß in einer Trugdolde	sehr groß, einfach, ledrig	flach kriechendes Rhizom, wintergrün	3
<b>B i s t o r t a</b> (Knöterich)	affinis	So-Hs/kühl, feucht	20	VII-IX	rosaweiß, rot verblühend in Ähren	lanzettlich	mattenbildend	2
<b>(Kerzenknöterich)</b>	amplexicaulis	So/normal	100	VII-X	weiß, rosa, rot in ährigen langen Rispen	lang gestielt und breit-lanzettlich	locker horstig, dicke Rhizome	6
<b>B i s t o r t a</b>	officinalis	So/frisch	90	VII	rosa in endständigen Ähren	langgestielt, breit-lanzettlich	stark wachsende Staude für Feuchtwiesen	2
	officinalis 'Carneum'	So/frisch	20	VII	rosarot in kurzen endständigen Ähren	lanzettlich, zierlich	relativ horstig wachsend	3



Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<i>Bistorta</i>	officinalis 'Hohe Tatra'	So/frisch	40	V-VII	dunkelrosa in Ähren	langgestielt, breit-lanzettlich	horstig	4
<b>B o e h m e r i a (Ramie)</b>	nivea	Hs/nährstoffreich, frisch	80	VII-VIII	weiß, rispenartige Blütenstände	breit-oval, zugespitzt, am Rand gesägt, untere bereits weiß behaart	erinnert an Brennnesseln, horstig wachsend	6
<b>B r u n n e r a (Kaukasusvergißmeinnicht)</b>	macrophylla	Hs/frisch	30	IV-V	blau in rispigen zusammengesetzten Blütenständen	langgestielt, breit herzförmig, dunkelgrün	horstig wachsend, z.B. zwischen Schneeglöckchen und Lerchensporn	3
	macrophylla 'Betty Bowring'	Hs/frisch	30	IV-V	weiß in rispigen Blütenständen	breit herzförmig, hellgrün	horstig wachsend	4
<b>B u p h t a l m u m (Ochsenauge)</b>	salicifolium	So/trocken, nährstoffarm, basisch	50	VI-VIII	gelb, margeritenähnlich	lanzettlich	horstig wachsende Wiesenstaude	2
<b>C a l a m i n t h a (Bergminze)</b>	nepeta	So/trocken	30	VI-VIII	hell-lila Blütchen aus den oberen Blattachseln	grau, klein, breit-oval und gekerbt	aromatisch duftend (für Tee geeignet), Selbstausaat, eher lagernd	2
	nepeta 'Blue Cloud'	So/trocken	30	VI-VIII	hell-lila Blütchen	graugrün, etwas glänzend, klein	aufrecht, keine Selbstausaat	4
<b>C a l l i r h o e (Mohnmalve)</b>	involucrata	So/trocken	30	VI-IX	magentarote Mohnblüten	erinnern an Storchschnabel	lange Triebe, flach ausgebreitet, rübig Wurzel	4
<b>C a m p a n u l a (Glockenblume)</b>	alliarifolia	So-Hs/trocken-frisch	50	VII	weiß, spitzzipfelig, langgezogene Rispe	herz-eiförmig, langgestielt	wüchsige Art für Naturgärten	2
<b>(Zwerg-Glockenblume)</b>	cochleariifolia	So-Hs/trocken	10	VI-VIII	blau, weiß, nach unten hängende Glöckchen	klein, langgestielt, eiförmig	für den Steingarten, dünne unterirdische Ausläufer	3
	garganica	So-Hs/trocken.-frisch	15	VI	hell-lilablau, sternförmig	langgestielte kerbzahnige,	horstig, wintergrün	3
	lactiflora	So/trocken-frisch, nährstoffreich	100	VI-VIII	hellblau, vielblütige Rispen	oval lanzettlich, gesägt	üppige, aufrechte Staude	3
	persicifolia	So-Hs/nährstoffreich	70	VI-VII	blau, weiß, breitglockig	dunkelgrün, schmal und lang	Grundblätter in einer Rosette, Stängel aufrecht	2
<b>(Polsterglockenblume)</b>	poscharskyana 'E.H.Frost'	So-Hs/trocken-frisch	15	VI-VII	weiße spitzzipfelige Blüten an langen Ranken	gestielt, rundlich herzförmig, gezähnt	kurze Ausläufer, wintergrünes Polster	3

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
C a m p a n u l a	poscharskyana 'Lisduggan'	So-Hs/trocken-frisch	15	VI-VII	rosa spitzzipfelige Blüten an langen Ranken	gestielt, rundlich herzförmig, gezähnt	kurze Ausläufer, wintergrün	3
	poscharskyana 'Stella'	So-Hs/trocken-frisch	15	VI-VII	dunkelblaue spitzzipfelige Blüten an langen Ranken	gestielt, rundlich herzförmig, gezähnt	wintergrün, kurze Ausläufer	3
	rotundifolia	So-Hs/trocken-frisch	20	V-VIII	blaue kleine hängende Glöckchen	rundlich, klein, gestielt	zarte Erscheinung, dennoch wuchernd	3
	sarmatica	So-Hs/trocken	30	VI-VII	blaugraue Glocken	graufilzig, herz-eiförmig	horstig	3
<b>(Nesselblättrige Glockenblume)</b>	trachelium	So-Hs/trocken-frisch	70	VII-VIII	lilablau oder weiße trichterförmige Glocken	herzförmig-dreieckig, gesägt	horstig wachsend, Selbstausaat	3
<b>C e n t a u r e a (Flockenblume)</b>	atropurpurea	So/frisch, mineralisch	80	VI-VIII	dunkel purpurne Kornblumen	gefiedertes Laub	horstig	3
	jacea <b>(Wiesenflockenblume)</b>	So/trocken	80	VI-IX	purpurrote, kleine Kornblumen	lanzettlich, ganzrandig	horstig	2
	macrocephala	So/trocken-frisch	80	VI-VII	gelb, groß, mit braunen Hülschuppen	hellgrün, ganzrandig, länglich	horstig	3
	montana	Hs-So/trocken	40	V-VI	blaue Kornblumen	filzig behaart, ganzrandig, eilanzettlich	Ausbreitung über Wurzeln und Aussaat	2
	nigra	So/nährstoffarm/frisch	80	VII	purpurrote Kornblumen	untere B. gelappt, obere B. ganzrandig	horstartig wachsend	2
	phrygia	So/nährstoffreich	40	VII-VIII	violette Kornblume	zugespitzt, oval	horstartig wachsend	2
	scabiosa	So/trocken	70	VII-VIII	purpurne Kornblume	fiederteilig, graugrün	horstig wachsend	2
	simplicicaulis	So/mäßig trocken	20	VI-VII	rosa-lila Kornblume	doppelt fiederschnittig	kurze Ausläufer, Steinanlagen	3
<b>C e n t r a n t h u s (Spornblume)</b>	ruber	So/trocken, durchlässig	80	V-VIII	rote oder weiße kleine Blüten in Trugdolden	breit eiförmig, ganzrandig	halbkugelige Staude, reichblühend, Nachblüte nach Rückschnitt, Selbstausaat	2
<b>C e p h a l a r i a (Schuppenkopf)</b>	gigantea	So/trocken, nährstoffreich	250	VII-VIII	hellgelb auf langen Stielen, skabiosenähnlich	groß, fiederschnittig, behaart	Solitärstaude	3

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
Cephalaria	leucantha (radiata)	So/leicht lehmig	150	VII-VIII	weißlich gelb, fast kugelig	ledrig, unregelmäßig gefiedert	horstig, Selbstaussaat	3
<b>Cerastium (Hornkraut)</b>	tomentosum	So/trocken	15	V-VI	weiße Blüten in endständigen Trugdolden	silbrig, schmal	unterirdische Ausläufer, sehr konkurrenzstark	2
<b>Cerastigma (Bleiwurz)</b>	plumbaginoides	So/trocken, warm	20	VIII-IX	azurblau aus den oberen Blattachseln	verkehrt eiförmig, rote Herbstfärbung	mattenbildende, spätaustreibende Staude	3
<b>Chelone (Drachenkopf)</b>	obliqua	So-Hs/frisch	70	VIII	rosa Blütenähre	breit-lanzettlich	stabile Stängel, treibt kurze Ausläufer	3
<b>Chrysanthemum (Winteraster)</b>	x hortorum 'Ceddie Mason'	So/nährstoffreicher Gartenboden	60	IX	warmes rot, einfach	Bätter buchtig eingeschnitten	brauchen geschützten Standort	2
	x 'Cinderella'	So/nährstoffreich, durchlässig	60	X	weinrot, einfach	buchtig eingeschnitten	brauchen geschützten Standort	2
	x 'Erntekranz'	So/nährstoffreich, durchlässig	50	X	hellgelb, flach gefüllt	buchtig eingeschnitten	brauchen geschützten Standort	2
	x 'Poesie'	So/nährstoffreich, durchlässig	60	X	weiß, vielblütig	buchtig eingeschnitten	brauchen geschützten Standort	2
<b>Cicerbita (Milchlattich)</b>	bourgaei	So/trocken-frisch	120	VI-VII	blau ähnlich Wegwarte in einer Doldenrispe	oval zugespitzt	horstig und ausdauernd	4
<b>Cichorium (Wegwarte)</b>	intybus	So/anspruchlos	80	VII-IX	blau aus den Blattachseln, bis Mittag geöffnet	fiederspaltig bis lanzettlich	horstig, Tiefwurzler	2
<b>Cimicifuga (Silberkerze)</b>	racemosa (Juli-Silberkerze)	Hs/frisch, kühl	180	VII	weiß, Blütentrauben verzweigt und lang, z.T. überhängend	groß, geteilt	Blüten haben strengen Geruch	6
	ramosa rotlaubig	Hs/frisch, kühl	180	IX-X	weiß, aufrechte Blütentrauben	attraktive geteilte Blätter	angenehmer Duft	7
	rubifolia (Lanzensilberkerze)	Hs/frisch	150	VIII	weiß, aufrechte Blütentrauben, verzweigt	groß, grob geteilt	dunkel getönte Stängel	6
<b>Clematis (Waldrebe)</b>	x jouiniana 'Praecox'	Hs/trocken-frisch	flach	VIII-IX	fast weiß, hyazinthenähnlich	dunkelgrün, fein geteilt	niederliegende bis 3m lange Triebe	9

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>Clematis</b>	tubulosa–Hybriden ( <b>Hyazinthen-Clematis</b> )	So-Hs/nährstoffreich	130	VII-IX	geknäult in den oberen Blattachsen, blau	groß, dreigeteilt	duftend!	8
	recta `Purpurea`	So-Hs/mäßig trocken, etwas lehmig	80	VI-VII	weiße Blüten in endständigen Trugdolden	oval-lanzettlich, ganzrandig, im Austrieb rot	horstig, aufrecht	4
<b>Cnidium (Brenndolde)</b>	silaifolium	So/anspruchlos	7	VI-VIII	weiße Dolden	stark zerteilt und dunkelgrün	horstig	4
<b>Convallaria (Maiglöckchen)</b>	majalis	Hs/nährstoffreich	20	V	weiß, duftend	breit, oval	unterirdisch kriechend, Früchte rot, <u>giftig!</u>	3
<b>Coreopsis (Mädchenauge)</b>	major	So/trocken-frisch	60	VI-IX	gelbe Körbchenblüten	dreigeteilt	horstig, kurzlebig	3
	tripteris	So/trocken-frisch, nährstoffreich	150	VII-IX	hellgelb mit dunkler Mitte	dunkelgrün, dreiteilig	Stängel straff aufrecht	3
<b>Crambe (Meerkohl)</b>	cordifolia	So/mäßig trocken, lehmhaltig	150	VII	kleine weiße Einzelblüten, großer Blütenstand	dunkelgrün, groß	beliebt bei Schnecken! Solitärstaude	5
<b>Deinante (Scheinhortensie)</b>	caerulea	Hs/humos, frisch, kühl	40	VII	lilablau, nickend	hortensienähnlich	kurze Ausläufer	6
<b>Delphinium (Rittersporn)</b>	x cultorum Saat	So/frisch, nährstoffreich, humos	180	VI,IX	blau in Variationen	gestielt, handförmig geteilt	anspruchsvolle Beetstaude	4
<b>Desmodium (Wandelklee)</b>	canadense	So/trocken bis frisch	100	VII-VIII	rotviolett, ährenähnlicher Blüstand	dreigeteilt	horstig, auffällige zackenförmige Samen	3
<b>Dianthus (Nelke)</b>	carthusianorum	So/kalkliebend, trocken	30	VI-VII	purpurrot, meist zu 6 in endständigen Köpfen	schmal, grün	locker rasenartiger Wuchs	2
	cruentus	So/trocken, mineralisch	60	VII	blutrot, bis zu 20 in endständigen Köpfen	schmal, grün	grasartige Polster, hohe Blütenstängel	2
	deltoides hort.	So/trocken, mager	10	VI-VIII	leuchtend rot	braungrün	flache Polster, Selbstsaat	2
	gratianopolitanus `Éydangeri`	So/trocken, feinschotterreich	15	VI	rosa, einfach	graugrün, schmal	nadeliges Polster, auch im Winter schön, duftend	3

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blüte- zeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preis- gruppe
<b>D i a n t h u s</b>	plumarius	So/trocken, feinschotterreich	25	VI-VII	weiß gefüllt	silbrig-grün, länger und etwas breiter	lagerndes höheres Polster, Blüten duften	3
	superbus	So-Hs/frisch	40	VI-VIII	rosa gefranst, rel. groß	grün und schmal	rasenartig wachsend, kurzlebig	2
<b>D i c e n t r a (Herzblume)</b>	spectabilis	So-Hs/frisch, durchlässig	80	V-VI	rot mit weiß, hängend in Trauben	grob gefiedert	alle Pflanzenteile fleischig und zerbrechlich	6
<b>D i g i t a l i s (Fingerhut)</b>	ferruginea	So-Hs/anspruchlos	100	VII	gelbbraun – rostrot, schlanke Trauben	grün, lang, genervt	kurzlebig, Selbstaussaat	2
	grandiflora	So-Hs/frisch, durchlässig	60	VI-VII	gelbe einseitwendige Traube	hellgrün, lanzettlich	langlebig	2
	lutea	So-Hs/trockenfrisch, kalkliebend	60	VI-VII	hellgelb, einseitwendige Traube	hellgrün, lanzettlich	kurzlebig	2
	purpurea	So-Hs/trockenfrisch	120	VI-VII	purpur bis weiß, lange Blütentrauben	kreppartig, eilanzettlich	zweijährig, Selbstaussaat	2
<b>D o r o n i c u m (Gämswurz)</b>	orientale	So/sandig-lehmig, durchlässig	30	IV-V	gelb, wie Margerite, langstielig	hellgrün, breit herzförmig	reagiert empfindlich auf zu große Feuchte im Boden	2
	pardalianches	Hs/normal, humos	80	VI	gelbe Margeritenblüte	hellgrün, behaart, breit herzförmig	wintergrün, zum Verwildern unter alten Obstbäumen geeignet	2
<b>D r a b a (Hungerblümchen)</b>	bruniifolia	So/sandig, durchlässig	5	III-IV	gelb kurz über dem Laub	moosartige, immergrüne Blattrosetten	dankbare Staude für Mauerefugen	2
<b>D r a c o c e p h a l u m (Drachenkopf)</b>	ruyschiana	So/mager und trocken	40	VI-VIII	blaue Lippenblüten in endständigen Quirlen	lineal-lanzettlich, grün	horstig und langlebig	3
<b>E c h i n a c e a (Sonnenhut)</b>	purpurea	So/trocken-frisch, nährstoffreich	70	VII-IX	purpur oder cremeweiß, hochgewölbte Mitte	breit, eiförmig mit langer Spitze	ganze Pflanze rau, horstig wachsend	2
<b>E c h i n o p s (Kugeldistel)</b>	bannaticus	So/trocken, warm	150	VII-VIII	blau, kugelig	graufilzig, fiederschnittig und bedornt	relativ standfest	4
	ritro 'Veitch's Blue'	So/anspruchlos, eher trocken	80	VII-IX	dunkelblau, kugelig	graufilzig, fiederschnittig und bedornt	relativ standfest	5

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>Echium (Natternkopf)</b>	vulgare	So/mager, trocken	60	VI-X	blau, sitzen dicht am Stängel	lineal-lanzettlich, an der Basis in Rosette	zweijährig, ganze Pflanze rau bis stechend	2
<b>Epimedium (Elfenblume)</b>	x perralchicum 'Frohneleiten'	Hs/trocken-frisch, humos	30	IV-V	gelb	glänzend, immergrün, dreigeteilt	kriechendes Rhizom, anspruchslos	3
	pinnatum ssp. colchicum	Hs/trocken-frisch	30	IV-V	gelbbraun	dreigeteilt, glänzend, rote Herbstfärbung	kriechendes Rhizom	3
	x rubrum	Hs/frisch	20	IV-V	rot	dreigeteilt, zierlich, sommergrün	kurze Ausläufer, weniger wüchsig	3
	x versicolor 'Sulphureum'	Hs/trocken-frisch	25	IV	hellgelb	dreigeteilt, wintergrün	kurze Ausläufer, weniger wüchsig	3
<b>Erigeron (Feinstrahlaster)</b>	speciosus in Sorten	So/nährstoffreich, eher trocken	50	VI-VII	feinstrahlige Margeritenblüte in rosa oder blau, verzweigter Blütenstand	schmal-lanzettlich	horstartig	3
<b>Eriogonon (Wollknöterich)</b>	allenii 'Little Rascal'	So/trocken	40	VII-IX	gelb, kleinblütig in breiten Schirmen	graugrün, paddelförmig	horstig und langlebig	3
<b>Eryngium (Edeldistel)</b>	giganteum	So/normal	80	VII-VIII	Blütenköpfe walzenförmig, Hochblätter silbrig	ungeteilte gestielte breit-ovale Blätter	kurzlebig	2
	planum	So/trocken	60	VI-IX	blau, stachelige Hüllblätter	ledrige Grundblätter	anspruchslos, Stängel im oberen Bereich verzweigt und bläulich	3
<b>Eupatorium (Dost)</b>	cannabinum	So/frisch	120	VII-IX	hellrosa Blüten, endständige lockere Doldentraube	gestielt, 3- 5-teilig, Einzellappen lanzettlich	lockerhorstig, Stängel im oberen Teil verzweigt	5
	fistulosum (?) 'Glutball'	So/frisch, nährstoffreich	200	VII-IX	purpurrote Doldentraube	quirliartig angeordnet	vieltriebige Solitärstaude mit dunklen Stängeln ( <u>nicht</u> hohl)	5
<b>Euphorbia (Wolfsmilch)</b>	cyparissias 'Fens Ruby'	So/trocken	25	IV-V	gelbe Trugdolde	nadelförmig, Austrieb rot, später vergrürend	unterirdische Ausläufer	3
	dulcis 'Chamaeleon'	So-Hs/frisch, kalkliebend	40	VI-VIII	unscheinbar braun	dunkelrot, oval-lanzettlich	versät sich an geeigneten Stellen, horstig	2

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5 = 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>Euphorbia</b>	lucida	So/eher frisch	150	V	grünlich gelb, vzweigter Blütenstand	eiförmig lanzettlich, ganzrandig	sehr voluminöse Staude, horstig	7
	mysrinites ( <b>Walzenwolfsmilch</b> )	So/trocken, kalkliebend	15	IV-VI	grüngelb	blaugrün, walzenförmig um den Stängel	Triebe niederliegend und lang, horstig	3
	palustris 'Walenburgs Glory'	So/eher frisch	80	V-VI	grünlich gelb endständig in oberen Blattachsen	eilanzettlich, weich	etwas lockerer als E. lucida	7
	polychroma (epithymoides)	So/trocken-frisch	30	IV-V	grüngelb, endständig	eilanzettlich	vieltriebig, horstig, Herbstfärbung	3
	sarawschanica	So/eher frisch	80	VII	gelbgrün, endständig in oberen Blattachsen	bläulich grün, eilanzettlich	horstig, voluminös	7
<b>Filipendula (Mädesüß)</b>	kamtschatica	So/frisch	200	VII-VIII	weiße Doldenrispe	5lappig, handförmig geteilt	raumgreifende Großstaude	5
	purpurea	So-Hs/frisch	80	VI	rosa Doldenrispe	handförmig geteilt	eher horstig wachsend	3
	rubra	So-Hs/frisch	150	VII	rosa Doldenrispe	rötlich getönt, fünfflappig	kurze Ausläufer	5
	ulmaria	So/frisch	150	VII-VIII	cremeweiß, trichterförmige Trugdolde	groß, unterbrochen gefiedert	nur kurze Ausläufer, Feuchtwiesenpflanze	3
	vulgaris	So/trocken	70	VII	weiße Blüten in einer Spirre	tief eingeschnitten, immergrüne Rosette	knollig verdickte schwarze Wurzeln	2
	vulgaris 'Plena'	So/trocken	30-40	VI	cremeweiß gefüllt	tief eingeschnitten, immergrüne Rosette	knollig verdickete schwarze Wurzeln	3
<b>Foeniculum (Fenchel)</b>	vulgare 'Red Form'	So/tiefgründig, keine Staunässe	100	VIII	gelblich in Dolden	rötlich grün, dillartig	eher kurzlebig, Selbstausaat	2
<b>Fragaria (Erdbeere)</b>	vesca ( <b>Walderdbeere</b> )	So-Hs/frisch, nährstoffreich	10	VI	weiß	dreigeteilt, gezähnt	durch Ausläufer neue Standorte besiedelnd	1
<b>Gaillardia (Kokardenblume)</b>	aristata in Sorten	So/mäßig trocken, durchlässig	30-60	VI-IX	gelb, gelbbraun und rot	graugrün, fiederspaltig, weich	eher kurzlebig, aber sehr lange blühend	2
<b>Galega (Geißraute)</b>	officinalis 'Alba'	So/anspruchlos	70	VII-VIII	weiße Blütenähren	paarig gefiedert	vieltriebig,, verzweigte Stängel	3
<b>Galium (Labkraut)</b>	odoratum ( <b>Waldmeister</b> )	Hs/nährstoffreich	20	IV-V	weiße Blüten in Trugdolde	hellgrün, quirlartig	kriechender Wurzelstock, duftet nach Cumarin	2

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5 = 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blüte- zeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preis- gruppe
<b>G a u r a</b> (Präriekeuze)	lindheimeri	So/trocken	90	VII-X	weiß, erinnern an Schmetterlinge	ganzrandig, oval-lanzettlich	eher kurzlebig, aufrechte oben verzweigte Stängel	2
<b>G e r a n i u m</b> (Storchschnabel)	x cantabrigiense `Bio-kovo`	So/trocken	20	V-VI	weiß	etwas wintergrün, rund, eingeschnitten	kurze Ausläufer	2
	x cantabrigiense 'Cambridge'	So/trocken	20	V-VI	violettrosa	etwas wintergrün, rund, eingeschnitten	kurze Ausläufer	2
<b>Geranium</b>	cinereum 'Guiseppii'	So/trocken, durchlässig	15	VI-VIII	magenta	wintergrün, tief eingeschnitten	zierlicher Storchschnabel, horstig	3
	dalmaticum	So/kalkliebend, durchlässig	15	VI-VII	rosa	immergrün glänzend	mattenbildend, für Steinanlagen und Mauerfugen	2
	himalayense	So/trocken-frisch	30	V-VI	leuchtend blau, groß	tief eingeschnitten	sommergrüne Matten bildend	2
<b>(Felsen-Storchschnabel)</b>	macrorrhizum `Ingwersen`	So-Hs/trocken	30	VI	lilarosa, zur Seite blickend	stark aromatisch, etwas klebrig	kriechende Rhizome, wintergrün	2
	macrorrhizum 'Spesart'	So-Hs/trocken	30	VI	fast weiß	stark aromatisch, etwas klebrig	kriechende Rhizome, wintergrün	2
	maculatum 'Vicky Lynn'	So-Hs/frisch und Humos	40	V	rosapurpur	fünf- bis siebenteilig	horstig, sommergrün	2
<b>(Pracht-Storchschnabel)</b>	x magnificum 'Rosemoor'	So-Hs/trocken-frisch	30	V-VI	blau	dunkelgrün, langgestielt, behaart	kurze Ausläufer, sommergrün, rote Herbstfärbung	3
	nodosum	Hs-So/trocken	30	VI-IX	hell violettblau	glänzend grün, 5teilig	Stängel rötlich, kurze Ausläufer und Selbstausaat	2
	x oxonianum	So-Hs/frisch	30	VI-VIII	pink	heller grün, 5teilig	lockerhorstig	2
	phaeum	Hs/frisch-trocken, nährstoffreich	60	V-VI	braunviolett, klein, nickend	frischgrün, Grundblätter in Rosette	horstig, sommergrün	2
<b>(Wiesen-Storchschnabel)</b>	pratense	So/frisch, nährstoffreich	80	VI-VII	blau und weiß, Scheindolde	langgestielt, tief eingeschnitten	horstig wachsend	2
	Prat.-Gruppe 'Brookside'	So/normal	40	VI-VIII	blau	langgestielt, tief eingeschnitten	lange blühend, horstig	3
	Prat.-Gruppe 'Orion'	So/frisch nährstoffreich	60	VI-VII	blau, großblumig	langgestielt, tief eingeschnitten	lange blühend, horstig	3

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5 = 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,



Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>Geranium</b>	Procurrens-Gruppe 'Dilys'	So/normal	20	VII-XI	purpur-karminrosa, kleinblütig	ähneln dem Blut-Storchschabelblatt	Triebe niederliegend	3
	psilostemon-Gruppe 'Patricia'	So/frisch, nährstoffreich	60	VI-VIII	magentarot mit schwarzem Auge	groß, langgestielt	horstig, lange blühend	4
	renardii	So/trocken, warm	20	VI	weiß mit lila Adern	grau, rundlich, kreppartig runzlig	horstig, etwas wintergrün	3
	renardii 'Terre Franch'	So/trocken	25	VI-VII	blauviolett mit Adern	graugrün, rundlich	üppiger als die Art	2
	sanguineum 'Album'	So/anspruchlos	30	VI-VIII	weiß	rund, dunkelgrün, tief eingeschnitten	lockerer Wuchs	2
	sanguineum x 'Tiny Monster'	So/anspruchlos	20	VI-VIII	purpurrot	rund, tief eingeschnitten, etwas behaart	lange niederliegende Triebe	2
	sanguineum var. striatum	So/anspruchlos	10	VI-VIII	hellrosa mit dunklen Adern	rund, tief eingeschnitten, dunkelgrün	kurze Ausläufer	2
	soboliferum	Hs/frisch	30	VII-IX	lilarot mit Adern	fein zerteilt	horstartig	3
	sylvaticum 'Birch Lilac'	So-Hs/frisch	50	V-VI	blauviolett	lang gestielt, tief eingeschnitten	horstartig	2
	wlassovianum	So/frisch	30	VII-IX	violett	rote Herbstfärbung	rötlicher Austrieb, horstig	2
<b>Geum (Nelkenwurz)</b>	chiloense	So/frisch, nährstoffreich	15	V-VI	orange gelb	grob gefiedert, grundständig	horstig	3
	x heldreichii 'Aurantiacum'	So/frisch, nährstoffreich	20	V-X	einfach orange	leierförmig gefiedert	leicht kriechendes Rhizom	3
<b>Goniolimon (Statice)</b>	collinum 'Sea Spray'	So/trocken	40	VII-VIII	weiß, verzweigte Blütenstände	ledrig grün, in Rosetten	als Trockenblume geeignet	3
<b>Gypsophila (Schleierkraut)</b>	paniculata	So/trocken, durchlässig	100	VI-VIII	weiß, vielblütige lockere Rispe	graugrün, länglich	halbkugeliger Busch	3
	paniculata x repens 'Rosenschleier'	So/trocken, durchlässig	30	VI-VIII	rosa in lockerer Rispe	graugrün, länglich	für den Steingarten geeignet	4
	repens	So/trocken, durchlässig	10	VI-VIII	weiß und rosa, kleine endständige Blürispen	grau, dicht beblättert	kurze Ausläufer, bleibt sehr flach	2

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blüte- zeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preis- gruppe
<b>H a c q u e t i a (Goldteller)</b>	epipactis	S-Hs/kalkliebend, humusreich	15	IV	gelblich, Döldchen	gestielt, handförmig geteilt	horstig	5
<b>H e l e n i u m (Sonnenbraut)</b>	x 'Baudirektor Linne'	So/ nährstoffreich	120	VIII	braun in Doldentrauben	breit lanzettlich	flachwurzelnde Grundro- setten, kräftige geflügelte Stängel	3
	x 'El Dorado'	So/ nährstoffreich	80	VI-VIII	gelb mit dunkler Mitte	breit lanzettlich	siehe oben	3
	x 'Kanaria'	So/ nährstoffreich	100	VIII	gelb mit gelber Mitte	breit lanzettlich	siehe oben	3
	x 'Luc'	So/ nährstoffreich	80	VII-IX	orangebraun	breit lanzettlich	siehe oben	3
	x 'Rauchtopas'	So/nährstoffreich	120	VIII	bernsteinfarben	breit lanzettlich	siehe oben	3
	x 'Septemberfuchs'	So/nährstoffreich	160	VIII-IX	hellbraun	breit lanzettlich	siehe oben	3
<b>H e l i a n- t h e m u m (Sonnenröschen)</b>	x 'Ben Hope'	So/trocken, durchlässig	20	V-VIII	rosa in endständigen traubenartigen Wickeln	grün , schmal, kurz	immergrüne Halbsträu- cher, Gefahr bei Kahlfrost	3
	x 'Eisbär'	So/trocken, mine- ralisch	30	V-VI	weiß	graugrün, schmal	siehe oben	3
	x 'Henfield Brillant'	So/trocken, mine- ralisch	25	V-VI	orange	graugrün, schmal, kurz	siehe oben	3
	x 'Sterntaler'	So/trocken, mine- ralisch	25	V-V	gelb	grün, schmal, kurz	siehe oben	3
<b>H e l i a n t h u s (Sonnenblume)</b>	atrorubens 'Semiplena'	So/normal, nähr- stoffreich	180	IX	gelb,großblumig	breit oval zugespitzt, rau	kurze Ausläufer, gute Schnittblume	5
	giganteus 'Sheilas Sunshine'	So/normal, nähr- stoffreich	180	IX X	weißgelb	lanzettlich, rau	kurze Ausläufer, sät sich echt aus	5
	grosse-serratus	So/normal, nähr- stoffreich	180	VIII-IX	gelb	dunkelgrün, eiförmig zugespitzt	horstig wachsend	5
	microcephalus	So/frisch, nähr- stoffreich	180	VIII-IX	gelb, gestielte kleine Blüten aus den oberen Blattachsen	dunkelgrün, eiförmig zugespitzt	aufrechte vieltriebige Stän- gel mit kurzen Ausläufern	5
	microcephalus 'Lemon Queen'	So/frisch, nähr- stoffreich	180	IX-X	grüngelb	hellgrüner als die Art	eher horstartig wachsend	5

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blüte- zeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preis- gruppe
<b>Helianthus</b>	orgyalis	So/eher frisch	250	VIII-IX	gelb, langgestielt aus den oberen Blattachseln	spärlich, weidenartig belaubt	kurze Ausläufer, ausladend, aber gut stehend	5
	salicifolius	So/trocken, nährstoffreich	250	X	gelb aus den oberen Blattachseln	dicht weidenartig belaubt	flach kriechendes Rhizom, kann trotzdem trocken stehen, nicht sehr standfest, aber elegant	7
<b>Helichrysum (Strohblume)</b>	italicum (Currykraut)	So/trocken, durchlässig	30	VII-VIII	gelb, wie bei Immortellen	silbrig, schmal, aromatisch	Halbstrauch	3
<b>Heliothis (Sonnenauge)</b>	helianthoides var. scabra 'Summernights'	So/mäßig frisch-nährstoffreich	120	VI-IX	orange-gelb, einfach	rötlich-grün, breit-oval	horstig wachsend	3
<b>Helleborus</b>	foetidus 'Westerflisk' (Nieswurz)	So-Hs/trocken, mager	40	III-IV	hellgrün, rot gesäumt, rote Blütenstiele	rote Blattstiele, 11 Blattsegmente	besonders im Winter schön	4
	x hybridus (Lenzrose)	So-Hs/trocken-frisch	40	III-IV	violetttrötlich, hängend oder zur Seite schauend	langgestielt, bis zum Grund geteilt	langlebig	9
<b>Hemerocallis (Taglilie)</b>	Hybriden	So-Hs/trocken-frisch, nährstoffreich	40-100	VII-VIII	gelb, orange, rot, Blüten öffnen sich nacheinander	grundständig, linealisch leicht überhängend	horstige, oft früh austreibende Stauden, duftend	5
<b>Hesperis (Nachtviole)</b>	matronalis	So-Hs/trocken-frisch	80	V-VI	weiß oder violett, rispige Blütenstände	dunkelgrün, breit-oval	horstartig, z.T. kurzlebig, duftend	2
<b>Heterotheca (Goldaster)</b>	villosa var. glandulissima	So/trocken	150	VIII-IX	gelbe Asternblüten	hellgrün, breit-lanzettlich, behaart	wie Rauhblassaster	3
<b>Heuchera (Purpurglöckchen)</b>	Heuchera allgemein	So-Hs/trocken-frisch, nährstoffreich	30-60	V-X	in lockeren Rispen hoch über dem Laub	rundlich, langgestielt, behaart, grün oder rotbraun	oft immergrüne horstartige Stauden, im Winter vor Kahlfrösten schützen	
	cylindrica 'Greenfinch'			V-VI	grünlich	grün mit weißer Zeichnung		3
	sanguinea 'Ruby Bells'			V-VI	dunkelrot	grün	relativ niedrig	3
	villosa			IX-X	weiß im Oktober	hellgrün, behaart	gedeiht gut im trockenen Schatten	3
	x 'Landpartie'			VII	weiß	rot gewellt		3

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5= 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blüte- zeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preis- gruppe
<b>Hieracium (Habichtskraut)</b>	aurantiacum	So/trocken, mager	30	VI-VIII	orange, klein im Knäuel	behaart, in Rosetten	unter- und oberirdische Ausläufer, auch Selbstausaat	2
<b>Hosta (Funkie)</b>	- Hybriden	Hs/trocken-frisch	20-80	VI-IX	violett bis weiß, glockenförmig	gestielt breit oval zugespitzt, verschiedene Farben	horstartig wachsende Blattschmuckstaude, manchmal duftend	
	x 'Crispula'		40	VII	violettblau	grün, weißer Rand		5
	x 'Elata'		60	VII	hellblau-violett	hellgrün, sehr langgestielt		5
	x 'Fortunei Aureomarginata'		40	VII	violett	grün, gelber Rand		5
	x 'Gold Standard'		50	VII	violett	zunehmend gelber		5
	x 'Krossa Regal'		70	VII	hellviolett	bläulich		5
	x 'Lancifolia'		30	VII	hellviolett	grün, schmal		5
	x 'Royal Standard'		40	IX	weiß, duftend	glänzend grün		5
<b>Hypericum (Johanneskraut)</b>	androsaemum	So-Hs/normal	50	VI-VIII	gelbe Schalenblüte, lange Staubfäden	oval ganzrandig	beerenartige Früchte, die sich von rot nach schwarz verfärben, strauchtig	3
	perforatum	So-Hs/trocken	70	VI-VII	gelb, viele kleine Blüten, die sich nach und nach öffnen	klein oval	verholzte aufrechte Stängel, Heilpflanze	2
	polyphyllum	So/trocken	20	VI-VIII	gelb, groß	graugrün klein oval	kleiner Halbstrauch	2
<b>Hyssopus (Ysop)</b>	officinalis	So/trocken, warm, kalkliebend	40	VII-VIII	blau, rosa oder weiß, endständige Rispen	kleine Blättchen, aromatisch duftend	Halbstrauch	3
<b>Iberis (Schleifenblume)</b>	saxatilis	So/trocken, mager	10	III-IV	weiß, endständige Dol-den	dunkelgrün, ledrig, klein	kleiner Halbstrauch	3
<b>Iberis</b>	sempervirens	So/trocken, mager	30	V	weiß, einständige Dol-den	dunkelgrün, lanzettlich, immergrün	mattenartig wachsender Halbstrauch, Rückschnitt nach der Blüte	3
<b>Inula (Alant)</b>	ensifolia	So/trocken, kalkliebend	25	VII-VIII	gelb, margeritenähnlich	lanzettlich	wächst dichtbüschelig mit kurzen Ausläufern	2

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5 = 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>Inula</b>	helenium	So/trocken	200	VII	gelb, endständige Dol-dentraube	sehr groß, behaart	Solitärstaude mit sehr dicken Stängeln	5
	magnifica `Sonnenstrahl`	So/trocken	200	VI-VII	gelb, groß, feine lange Zungenblätter	dunkelgrün, groß	Solitärstaude	5
	racemosa 'Sonnen-speer'	So/tiefgründig, nährstoffreich	200	VIII	gelb, langgezogen, trau-biger Blütenstand	lang, groß	Solitärstaude	5
<b>Iris (Schwertlilie)</b>	graminea	So/normal	30	VI	violett, duftet nach Pflaume	schmal	bildet dichte rasenartige Horste	3
	sibirica in Sorten ( <b>Wiesen-Iris</b> )	So/frisch, kühl, nährstoffreich	90	VI	alle Farben, Stängel mehrblütig	leicht bläulich, schmal und hoch	bildet dichte Horste	5
	spuria 'Dorothy Foster' ( <b>Steppeniris</b> )	So/lehmhaltig, durchlässig	100	VI-VII	blau	bläulich-grün, bis 2 cm breit	kurze Ausläufer, Langsamentwickler	5
	spuria 'Imperial Bronze'				dunkles gelb			5
<b>Isatis (Färberwaid)</b>	tinctoria	So/anspruchlos	100	VI	leuchtend gelb, raps-ähnlicher Blütenstand	länglich, ganzrandig, zugespitzt	kurzlebig, wurde früher zur Blaufärbung benutzt, schwarze, hängende Samen	2
<b>Kalimeris (Schönaster)</b>	incisa	So/trocken-frisch	50	VII-VIII	hellblau	eingeschnittene gezähnte Blättchen	horstartig wachsend	3
	incisa 'Madiva'				hellblau, größere Blüten			4
	mongolica	So/trocken-frisch	90	VIII	hellviolett	tief fiederschnittig	horstartig wachsend	3
<b>Kirengeshoma (Wachsglocke)</b>	palmata	Hs/frisch	100	IX	gelb, endständig, glockenähnlich	spitzlappig	horstig wachsend, vor Spätfrösten schützen	5
<b>Kitaibelia (Kitaibelie)</b>	vitifolia	So/trocken-frisch	200	VII-VIII	weiß, malvenähnlich	fächerig gelappt, behaart	ausladende Solitärstaude	3
<b>Knautia (Witwenblume)</b>	arvensis	So/trocken, mager	70	VII-IX	violett-blaue Köpfchen	leierförmig fiederschnittig	staudig bis zweijährig	2
	drymeia	So/trocken	60	IV-X	lila Köpfchen	ganzrandig, langgestreckt	breit lagernder Busch	2

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<i>K n a u t i a</i>	macedonica	So/trocken, nährstoffreich	80	VII-IX	dunkelrot, zahlreich	graugrün, behaart, untere Bl. ganzrandig	breitbuschige Staude	2
<b>K n i p h o f i a (Fackellilie)</b>	hirsuta	So/nährstoffreich	50	VI-IX	korallenrot in Trauben	schmal und rau (grasartig)	dichte Horste	4
<b>L a m i u m (Goldnessel)</b>	galeobdolon ssp. flavidum `Silberteppich`	Hs/trocken-frisch	40	VI-VII	blassgelbe Lippenblüten in Quirlen übereinander	silbrig, grüne Blattadern, scharf gezähnt	horstig wachsend	2
	galeobdolon ssp. galeobdolon	Hs-So/trocken-frisch	40	V-VI	gelbe Lippenblüten in Quirlen	weiß gezeichnet	konkurrenzstarker wintergrüner Bodendecker, lange Triebe	2
	maculatum 'White Nancy'	So-Hs/nährstoffreich	10	IV-VIII	weiße Lippenblüten in Quirlen	silbrig rundlich gezähnt	mattenartig	2
	orvala	Hs/nährstoffreich	60	VI	braunrote Lippenblüten	dreieckig, gezähnt	horstig	3
<b>L a s e r p i t i u m (Laserkraut)</b>	latifolium	So/trocken-frisch	100	VI-VII	weiß, große Dolden	mehrfach geteilt	horstig	4
<b>L a t h y r u s (Platterbse)</b>	vernus	Hs/frisch, nährstoffreich, kalkliebend	30	IV-V	purpurrot, bläulich verblühend, in Trauben	paarig gefiedert	horstartig wachsend, halbkugelig	4
<b>L a v a n d u l a (Lavendel)</b>	angustifolia 'Dwarf Blue'	So/trocken, warm	40	VII	blau	graugrün, lanzettlich	Strauch	2
	angustifolia `Hidcote Blue`	So/trocken, warm	40	VI-VIII	violettblau	hellgrau, kurz, lanzettlich	Strauch, Rückschnitt im Frühjahr	2
	angustifolia 'Munstead'				mittelblau	hellgrau, kurz, lanzettlich	nach starkem Rückschnitt wieder gut austreibend	3
	angustifolia 'Siesta'	So/trocken, warm	40	VII	violettblau	graugrün lanzettlich	Strauch	2
	angustifolia 'White Hidcote'		40	VII	weiß		Strauch	2
	x intermedia 'Fragrant Memories'		60	VIII	blauviolett	langnadelig, graugrün	Blüten für Duftkissen geeignet	2
<b>L a v a t e r a (Buschmalve)</b>	cashemeriana	So/nährstoffreich/frisch	160	VII-IX	pink	graugrün, 5lappig	horstig, tiefgehend Wurzel	3
<b>L e o n u r u s</b>	cardiaca ssp. villosus	So/anspruchlos	120	VII-VIII	mattviolett, Blütchen in	geteilt und gezähnt	aufrecht stehende, be-	2

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5 = 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blüte- zeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preis- gruppe
(Herzgespann)					den Blattachsen		haarte, stachelige Staude	
<b>L e p i d i u m</b> (Kresse)	latifolium (Pfefferkraut)	So/durchlässig	80	VI	weiß, klein in Trauben	ganzrandig, oval, später ledrig	Blätter schmecken nach Meerrettich	3
<b>L e u c a n t h e m e l l a</b> (Wucherblume)	serotina	So/trocken-frisch, nährstoffreich	100	IX-X	weiß, vielblütig, Margeri- tenblüten	länglich lanzettlich, scharf gezähnt	Stängel straff aufrecht, kurze Ausläufer	3
<b>L e u c a n t h e m u m</b> (Margerite)	x superbum	So/guter Garten- boden, eher tro- cken	70	VI-VIII	strahlend weiß, einfach	dunkelgrün, ledrig, gezähnt, lanzettlich	kurze Ausläufer	2
	vulgare	So/anspruchlos	70	V-VI	weiß	dunkelgrüne Rosetten	Selbstaussaat	2
<b>L e u z e a</b> (Bergscharte)	rhapontica	So/trocken, etwas lehmig	70	VII-VIII	Knospen haben braune Schuppen, Blüte lila	z.T. fiederschnittig	horstig, sehr dauerhaft	5
<b>L e v i s t i c u m</b> (Liebstöckel)	officinale	So-Hs/nährstoff- reich, frisch	200	VII-VIII	gelbe Blütendolden	groß, fiederteilig	ganze Pflanze aromatisch	3
<b>L i a t r i s</b> (Prachtscharte)	spicata	So/trocken-frisch	60	VII-VIII	violett und weiß, in einer Ähre, von oben nach unten aufblühend	schmal, lang	horstartig, knollige Wur- zeln	3
<b>L i g u l a r i a</b> (Greiskraut/Kreuz- kraut)	przewalskii	So/frisch, nähr- stoffreich	120	VII-VIII	gelbe kleine Einzelblü- ten in einer langen Trau- be	violettgrün, sehr ele- gant eingeschnitten	Stängel bräunlich	4
	stenocephala x prze- walskii 'The Rocket'	So/frisch, nähr- stoffreich	140	VII-VIII	gelb in einer Traube	tief eingeschnitten, dunkelgrün	ähnelt L. przewalskii, nur etwas gröber	5
	stenocephala x 'Wei- henstefan'	So/frisch, nähr- stoffreich	160	VII-VIII	gelb, lange schlanke Traube	Grundblätter, lang, gestielt, scharf ge- zähnt, heller grün	attraktive Solitärstaude	5
<b>L i m o n i u m</b> (Meerlavendel)	gmelinii ssp. hungari- cum	So/trocken, nähr- stoffreich	40	VII-VIII	violette Einzelblüten in Doldenrispe	dunkelgrün, ledrig in Grundrosette	langlebige horstige Staude	3
	latifolium	So/trocken	40	VII-VIII	hellviolette Einzelblüt- chen, ausladende Dol- denrispe	Grundblätter dunkel- grün, ledrig, Rosette	langlebige horstige Staude	3

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>L i n a r i a</b> <b>(Leinkraut)</b>	purpurea	So/trocken	80	VI-VIII	violett, dichte endständige Traube	violettgrau, schmal	kurzlebige, vieltriebige Staude, Selbstausaat	3
<b>L i n u m</b> <b>(Lein)</b>	perenne	So/trocken	50	V-VII	blau	bläulich, lanzettlich	kurzlebig, Selbstausaat	2
<b>L i t h o s p e r m u m</b> <b>(Steinsame)</b>	purpureocaeruleum	So-Hs/trocken, nährstoffreich, kalkliebend	30	VI	enzianblau in Wickeltrauben	grau, behaart, schmal	lange, bogig überhängende Triebe, Früchte weiß, wuchert	2
<b>L u n a r i a</b> <b>(Silberblatt)</b>	rediviva <b>(Mondviole)</b>	Hs/frisch, nährstoffreich	70	V-VII	hellviolett, lockere Dolentrauben	groß, gezähnt	langlebige horstige Staude, duftet nachts	5
<b>L y c h n i s</b> <b>(Lichtnelke)</b>	chalcedonica <b>(Brennende Liebe)</b>	So/trocken -frisch, nährstoffreich	80	VI-VII	orangerot, Trugdolden	hellgrün, lanzettlich, behaart	horstig wachsende behaarte Staude	2
	coronaria <b>(Vexiernelke)</b>	So/trocken	60	VII-VIII	karminrot und weiß, langgestielt, einzeln	länglich eiförmig, weißfilzig	kurzlebig, erhält sich über Selbstausaat	2
	viscaria <b>(Pechnelke)</b>	So/trocken, mager	50	V-VI	purpurrosa, traubig-rispig	Grundblätter lanzettlich	Stängel klebrig	2
<b>L y s i m a c h i a</b> <b>(Felberich)</b>	ciliata	So/frisch, nährstoffreich	60	VI-VIII	hellgelb aus den Blattachsen	grünbraun, eilanzettlich, spitz	Ausläufer	3
	ciliata `Firecracker`	So/frisch, nährstoffreich	80	VI-VIII	hellgelb, aus den oberen Blattachsen	schwarzrot, eilanzettlich	Ausläufer	3
	clethroides	So/frisch, nährstoffreich, kühl	70	VII-IX	weiß, gebogene Ähren	eilanzettlich	Ausläufer, rotorange Herbstfärbung	3
	punctata	So/frisch, nährstoffreich	100	VI-VII	gelb, quirlartig aus den oberen Blattachsen	eilanzettlich, quirlständig	ganze Pflanze behaart, Ausläufer	3
<b>L y t h r u m</b> <b>(Weiderich)</b>	salicaria <b>(Blutweiderich)</b>	So/frisch	100	VI-VIII	purpurrot, lange Scheinähren	schmal lanzettlich	stark verholzende, gut aufrechte Stängel, Selbstausaat	2
	salicaria 'Blush'	So/frisch	60	VI-VIII	zartrosa	schmal lanzettlich	stark verholzende Staude	3
	virgatum 'Rose Queen' <b>(Rutenweiderich)</b>	So/frisch	60	VII-VIII	rosarot	schmal-linealisch	zierlicher als L. salicaria, versät sich nicht	3
<b>M a c l e a y a</b> <b>(Federmohn)</b>	microcarpa	So/normal	250	VII-VIII	ockerfarben, große Blütenrispen	blaugrün, groß, gebuchtet	Solitärstaude, Milchsaft der Pflanze führt zu photo-toxischen Reaktionen!	5



Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blüte- zeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preis- gruppe
<b>M a l v a (Malve)</b>	alcea var. fastigiata	So/normal	100	VI-IX	rosa aus Blattachseln	5- 7teilig	sehr lange blühend	3
<b>M e l i s s a (Melisse)</b>	officinalis	So/anspruchlos	50	VI	weiß, unscheinbar	breit-oval, gesägt, zugespitzt	ganze Pflanze duftet nach Zitrone, Selbstaussaat	2
<b>M e n t h a (Minze)</b>	x piperita in Sorten	So-Hs/frisch, nährstoffreich	50	VII	weiß bis lila, in Scheinquirlen	aromatisch	Ausläufer	2
<b>M e u m (Bärwurz)</b>	athamanticum	So/trocken-frisch, mager	40	V-VI	weiße Dolden	aromatisch feinzerteilt	Tiefwurzler, kräftig würziger Geschmack	4
<b>M o n a r d a (Indianernessel)</b>	Hybride 'Jacob Cline'	So/frisch, nährstoffreich	80	VII-VIII	tief lachsrot, in Quirlen übereinander	gegenständig, gezähnt, duftend	kriechender Wurzelstock	3
<b>M y r r h i s (Süßdolde)</b>	odorata	So-Hs/kühl, frisch	80	VII	weiße Blütendolden	hellgrün, fein geteilt	ganze Pflanze duftet nach Anis, Samen schwarz und gerippt	3
<b>N e p e t a (Katzenminze)</b>	x faassenii 'Walker's Low'	So/trocken-frisch, nährstoffreich	50	VI-VIII	violettblau, ährenförmig	graugrün, matt, runzelig, aromatisch	unermüdlicher Sommerblüher	3
	grandiflora	So/frisch, nährstoffreich	100	VI-VIII	blaulila achselständig	stumpfgrün, gekerbt	bei ausreichender Bodenfeuchte langanhaltender Flor	3
	racemosa	So/trocken, mager	20	V-IX	weiß und blau, endständige Ähren, aromatisch	grau, klein und gekerbt, herzförmig	horstartig	3
	sibirica	So/trocken-frisch, nährstoffreich	80	VI-VIII	blau, große Lippenblüten aus den oberen Blattachseln	spitz lanzettlich, gezähnt	Stängel mehr oder weniger aufrecht, Ausläufer,	3
	subsessilis	So/frisch, nährstoffreich	80	VI-VIII	blau, achselständig, relativ groß	breitere Blätter, gezähnt, zugespitzt	kurze Ausläufer	3
<b>O e n o t h e r a (Nachtkerze)</b>	macrocarpa	So/trocken	20	V-IX	gelb, sehr groß und gestielt	glänzend, ledrig	lange, auf dem Boden liegende Triebe, geflügelte, große Früchte	3
	pilosella	So/anspruchlos	50	VI-VIII	gelbe breite Schalenblüten am Ende der Stängel	rote Blattrosetten im Winter	kurze Ausläufer	2
<b>O m p h a l o d e s (Gedenkemein)</b>	verna	Hs/frisch-nährstoffreich	10	III-IV	blau oder weiß, lockere Trauben	hellgrün, breit-oval, zugespitzt	sommergrüner, kriechender Bodendecker	3

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5 = 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>O r i g a n u m</b> (Dost)	vulgare 'Aureum'	So-Hs/trocken	20	VII-VIII	weiß, kopfige Blütenstände aus den oberen Blattachsen	gelblich, weich, aromatisch	in der Sonne verbrennen die Blätter – eher halbschattig pflanzen	3
Origanum	vulgare ssp. hirtum	So/trocken	20	VII-VIII	weiß, kopfige Blütenstände	klein, ganzrandig, oval	nennt man auch Pizza-Oregano	2
<b>P a c h y s a n d r a</b> (Ysander)	terminalis	Hs/frisch, humos, leicht sauer	25	V	weiß, kurze Ähren	dunkelgrün, glänzend	immergrüner Bodendecker, kriechendes Rhizom	3
<b>P a e o n i a</b> (Pfingstrose)	Lactiflora-Sorten	So/tiefgründig, mittelschwerer humoser Lehm	80	VI	weiß bis rosarot, einfach oder gefüllt, einzeln oder zu mehreren	dunkelgrün, geteilt, glatt	dicker Wurzelstock, sehr langlebig, im <b>Herbst</b> pflanzen	10
	officinalis	So/relativ anspruchslos	60	V	rosa oder rot gefüllt	heller grün und größer als P. lactifolia	Wurzeln knollig verdickt	9
	tenuifolia	So/relativ trocken	40	V	rot gefüllt	fein geschlitzt	langsam wachsend	10
<b>P a r t h e n i u m</b> (Präieampfer)	integrifolium	So-Hs/nährstoffreich	80	VII-IX	weiß, endständige Dol-den	ungeteilt, derb, länglich oval	dicke Stängel, horstig	3
<b>P a t r i n i a</b> (Goldbaldrian)	scabiosifolia	So-Hs/lehmig-humos	150	VII-VIII	kühles gelb, vielblumige Trugdolden	fiederteilig	horstig	3
<b>P e n s t e m o n</b> (Bartfaden)	digitalis 'Husker Red'	So/trocken-frisch	70	VII-VIII	hell-lila, Blütenstängel rötlich	bronzepurpurne Blattrosetten	horstig, ein relativ langlebiger Barfaden	3
	serrulatus	So/warm, humos	40	VI-VII	blauviolett aus den oberen Blattachsen	gezähnt, oval, zugespitzt	etwas verholzend	3
<b>P e r o v s k i a</b> (Blauraute)	atriplicifolia	So/trocken, durchlässig	100	VIII-IX	blau in langen endständigen Rispen	graufilzig, eilanzettlich, grob gesägt	verholzend, ganze Pflanze aromatisch	3
<b>P e t r o r h a g i a</b> (Felsennelke)	saxifraga	So/trocken, mager, kalkliebend	20	VI-VII	rosa, lockere Blütenstände	nadelartig	Triebe niederliegend bis aufsteigend, wirkt wie ein zierliches Schleierkraut	2
<b>P e u c e d a n u m</b> (Haarstrang)	ostruthium (Meisterwurz)	So/anspruchslos	80	VI-VII	weiß, Dolden	grob geteilt	kriechendes Rhizom	3
<b>P h l o m i s</b> (Brandkraut)	russeliana	So/lehmig-humos	100	V-VI	hellgelb, in mehreren Quirlen übereinander	hellgrüne behaarte große herzförmige Grundblätter	stark verholzende aufrechte Stängel, immergrün, kriechender Wurzelstock	3

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
Phlomis	samia	So/lehmig-humos	100	VII-VIII	lilarosa, in Quirlen übereinander	graugrün, zugespitzt, gekerbt	Stängel kandelaberförmig, nicht ganz aufrecht	3
	tuberosa	So/trocken	70	VI-VII	violett-rosa, in Quirlen	dunkelgrün, herzförmig, gekerbt	knollig verdickte Wurzeln	3
<b>Phlox (Flammenblume)</b>	paniculata in Sorten	So-Hs/frisch, nährstoffreich	100	VII-VIII	üppige endständige Rispe, duftend, in weiß, rosa, pink, rot und violett	kreuzgegenständig, elliptisch	kurze Ausläufer	3
	subulata in Sorten	So/trocken, mineralisch	15	V	weiß, rosa oder hellblau	nadelig, dicht stehend, wintergrün	mattenbildender Phlox	3
<b>Physalis (Lampionblume)</b>	alkekengii	Hs-So/frisch, nährstoffreich, kalkliebend	80	VII	weiß, unscheinbar	oval zugespitzt	im Herbst orangerote Ballons aus den Blattachsen, wuchert!	3
<b>Phyostegia (Gelenkblume)</b>	virginiana `Alba`	So/frisch, nährstoffreich	60	VII	weiß, etwas verzweigter, ähriger Blütenstand	kreuzgegenständig breit-lanzettlich	kriechendes Rhizom, Stängel aufrecht, vierkantig	3
	virginiana `Vivid`	So/frisch, nährstoffreich	80	VIII-IX	purpurrosa	kreuzgegenständig breit-lanzettlich	kriechendes Rhizom, rötliche Herbstfärbung	3
<b>Platycodon (Ballonblume)</b>	grandiflorus	So/nährstoffreich, durchlässig	50	VI-VIII	blau oder weiß, glockenblumenähnlich	elliptisch, wechselständig	treibt aus weißen rübigem Wurzeln spät aus, Knospen ballonartig aufgebläht	3
<b>Polemonium (Jakobsleiter)</b>	caeruleum	So-Hs/frisch	70	V-VIII	blau oder weiß, locker kopfig	hellgrüne gefiederte Rosettenblätter	Selbstaussaat	2
<b>Potentilla (Fingerkraut)</b>	argyrophylla	So/mager, trocken	15	VI-VIII	orange-gelbe Erdbeerblüte	silbrig, erdbeerartig	ca. 60 cm breit, horstig wachsend	2
	atrosanguinea	So/mager, trocken	30	V-VI	dunkelrote Erdbeerblüte	silbrig-grün, erdbeerartig	horstig wachsend	2
	crantzii	So/mager	10	VI	gelb, bogige Blühtriebe, lockere Trauben	fünzfählige Grundblätter	flach und horstig	2
	x cultorum `William Rollisson`	So/durchlässig	30	VII-VIII	orange, lange, niederliegende Blühtriebe	grün, wie Erdbeere	lange Blühtriebe	4
	fragiformis	So/anspruchlos	30	V-VI	gelb	grün-silbrig, flauschig, dreiteilig	frühgrünend, horstig	2

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5= 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
Potentilla	nepalensis 'Mrs. Willmott'	So/eher frisch	30	VI-IX	kirschrosa	grün, flauschig	eher breit als hoch	2
	recta	So/anspruchslos	45	VI-IX	hellgelb bis sattgelb, Blütenstand verzweigt	grün, behaart	Pflanze steht aufrecht	2
	thurberi 'Monarch's Velvet'	So/anspruchslos	30	VII-IX	schwarzrot, samtig	dunkelgrün, wie Erdbeere, behaart	aufrecht, horstig	2
<b>Primula (Primel)</b>	Elatior-Hybr. 'Gold Lace'	Hs-So/frisch, lehmig-humos	20	IV-V	braunrot, goldgelber Rand, lockere Dolde	hellgrüne, runzlige Blätter	relativ langlebig	3
	veris ( <b>Wiesenschlüsselblume</b> )	So-Hs/trocken, leicht lehmig	20	IV-V	leuchtend gelb, 5 orangeflecken im Schlund, zart duftend	hellgrüne, runzlige Blätter in Grundrosette	unkompliziert und wüchsig über Selbstausaat	2
<b>Prunella (Braunelle)</b>	grandiflora	So/halbtrocken, mager	30	VI-IX	blau und weiß in Scheinquirlen	oval, ganzrandig bis gekerbt	lange blühende Kleinstau- de	3
	vulgaris	So/anspruchslos	15	VII-VIII	blauviolett in Scheinquirlen	oval, ganzrandig	guter Lückenfüller auf schwierigen Standorten, sät sich aus	2
<b>Pseudofumaria (Lerchensporn)</b>	alba	So-Hs/anspruchslos	30	V-IX	weiß, in Trauben	graugrün, 2-3fach gefiedert	Selbstausaat	3
	lutea	So-Hs/anspruchslos	30	V-IX	gelb, in Trauben	gelbgrün, 2-3fach gefiedert	Selbstausaat	3
<b>Pulmonaria (Lungenkraut)</b>	Hybr.-Cv. 'Roy Davidson'	Hs/frisch, nährstoffreich	30	IV-V	hellblau in endständigen Wickeltrauben	mittelgrün, silbrig weiß gefleckt	relativ horstig	3
	rubra	Hs/eher frisch, nährstoffreich	30	II-IV	ziegelrot	groß, oval zugespitzt und behaart	relativ horstig	3
<b>Pulsatilla (Kuhshelle)</b>	vulgaris in Farben	So/trocken kalkliebend	30	IV	violett, rot oder weiß, schalenförmig	fein eingeschnitten	alle Pflanzenteile behaart, fedriger Samenstand	3
<b>Pycnanthemum (Amerikanische Bergminze)</b>	muticum	So/relativ trocken	70	VII-IX	leicht rosa, dichte reichblütige Quirle	breiter, nach Minze duftend	kurze Ausläufer	3
	pilosum	So-Hs/relativ trocken	80	VII-IX	fast weiß, dichte reichblütige Quirle	schmal, behaart, aromatisch	kurze Ausläufer	3

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5 = 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<i>Pycnanthemum</i>	tenuifolium	So/trocken, mager	60	VII-VIII	hell, reichblütige Quirle	schmal-lanzettlich, nicht duftend	horstartig, verholzende Triebe	3
<b>Ranunculus (Hahnenfuß)</b>	aconitifolius	Hs/nährstoffreich, frisch, kalkarm	50	VI	weiß, zahlreich	handförmig gelappt	horstartig, verzweigte Stängel, zieht im Sommer ein	4
	acris 'Multiplex'	So/trocken-frisch, nährstoffreich	60	V-VII	gelb, dicht gefüllt, verzweigter Blütenstand	hellgrün, behaart, handförmig geteilt	kriechendes Rhizom	3
<b>Rhazya (Blaustern)</b>	orientalis	So/trocken-frisch	50	VI-VIII	hellblau in Dolden	eiförmig	ähnlich Amsonia, aber mit unterirdischen Ausläufern	5
<b>Rodgersia (Schaublatt)</b>	Henricii-Gruppe 'Die Anmutige'	Hs-So/frisch, keine Staunässe, warm	120	VII	rosa Blütenrispe	Blattaustrieb bronze, vergrünt, handförmig geteilt, runzlig	langsame Verbreitung über Rhizome	6
<b>Rudbeckia (Sonnenhut)</b>	fulgida var. deami	So/eher frisch	70	VIII-IX	orange-gelb mit schwarzer Mitte, vielblütig	behaart, breit-oval, gestielt	kurze Ausläufer, anspruchslos	3
	fulgida var. speciosa	So/eher frisch und nährstoffreich	40	VII-IX	orange-gelb mit schwarzer Mitte	behaart, schmal oval	eher horstig, zierlicher als die anderen beiden Arten	3
	fulgida var. sullivantii	So/frisch, nährstoffreich	60	VII-IX	orange-gelb mit schwarzer Mitte, vielblütig	dunkelgrün, rau, breit-oval, zugespitzt	kurze Ausläufer, braucht unbedingt besseren Boden	3
	laciniata	So/eher frisch	150	VII-IX	Blütenboden kegelförmig, Zungenblüten gelb	gestielt, 3- bis 5teilig, glatt	kurze Ausläufer, bei Schnecken beliebt	4
	nitida	So/trocken-frisch	180	VIII	kühl-gelb, Blütenblätter herabhängend, Mitte grün und hochgewölbt	dunkelgrün, glänzend, geteilt	kurze Ausläufer	4
	subtomentosa	So/mäßig frisch	100	VIII-IX	gelb, verzweigter Blütenstand	dreigeteilt, leicht grau behaart	horstig, Stängel aufrecht, duftet nach Cumarin	3
	triloba	So/mäßig frisch	80	VIII-X	gelb, kleinblumig	dreilappig, leicht rauhaarig	sich selbst aussäender Sonnenhut	2
<b>Rumex (Ampfer)</b>	scutatus 'Silver Shield'	So/durchlässig, basenliebend	30	V-VIII	weißlich grün	blaugrün, langgestielt, spießförmig	Ausläufer, wohlschmeckend	3
<b>Ruta (Weinraute)</b>	graveolens	So/trocken, durchlässig	60	VI-VII	gelb, Trugdolden	blaugrau, gefiedert, aromatisch	Rückschnitt im Frühjahr	3

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>S a l v i a (Salbei)</b>	glutinosa	So-Hs/trocken-frisch	80	VII-IX	gelb, klebriger Blütenstand	hellgrün, herz- bis spießförmig	stark verholzend	3
	nemorosa in Sorten	So/trocken, durchlässig, mager	40	VI-IX	in Quirlen dicht übereinander, blauviolett oder weiß	graugrün, runzlig, am Rand gezähnt	Rückschnitt nach 1. Blüte	3
	officinalis	So/trocken, durchlässig	60	VI-VII	blüht kaum	grau, oval	Halbstrauch, aromatisch	3
	sclarea ( <b>Muskatellersalbei</b> )	So/trocken, nährstoffreich	100	VI-VIII	rosa-violett, lila Hochblätter	graugrün, langgestielte, große, runzlige Grundrosette	zweijä	2
	verticillata	So/trocken, warm, kalkliebend	40	VII-IX	purpurlila, quirlartig übereinander	wirken flauschig, breit herzförmig	spät austreibend, Selbstaussaat	3
<b>S a n g u i s o r b a (Wiesenknopf)</b>	canadensis	So/frisch, nährstoffreich	100	VII-IX	weiß, aufrechte, lange, dicht gedrängte Ähren	gefiedert	kurze Ausläufer	3
	menziesii	So/trocken-frisch	60	VI-VII	dunkelrot, flaschenbürstenähnlich	gefiedert	kurze Ausläufer	3
	minor ( <b>Pimpinelle</b> )	So/mager, kalkliebend	40	V-VII	rötlich-grüne Köpfchen, zusammengedrängt	gefiedert und gezähnt, in Rosetten	kurzlebig, Selbstaussaat	2
	obtusa	So/frisch, nährstoffreich	60	VII-IX	dunkelrosa, flauschig, flaschenbürstenähnliche Blütenstände	groß, gefiedert	nicht sehr aufrecht, kriechende Wurzeln	3
	officinalis	So/trocken-frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	dunkelrot, kurz und aufrecht	gefiedert	wirkt elegant und steht gut	3
	x officinalis 'Rock'n Roll'	So/trocken-frisch, nährstoffreich	80	VI-VII	lila, schmale, aufrecht stehende Blütenähren	gefiedert	wirkt filigran	3
	officinalis 'Tanna'	So/trocken-frisch, nährstoffreich	40	VI-VIII	schwarzrot, länglich, auf dünnen verzweigten Stielen	gefiedert	wirkt kompakt	3
	poterifolia	So/frisch, nährstoffreich	150	VIII-IX	dunkelrot, aufrechte Blütenähren bis 10 cm lang	gefiedert	wirkt etwas gröber als S. officinalis	3
	tenuifolia var. alba 'Albiflora'	So/frisch, nährstoffreich	180	VII-VIII	weiß, schmale herabhängende Blütenköpfe	gefiedert	gut aber nicht steif aufrecht stehend	3

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5 = 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blüte- zeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preis- gruppe
<b>S a n t o l i n a</b> (Heiligenkraut)	chamaecyparissus	So/trocken, ma- ger	40	VII-VIII	gelbe Köpfchen auf lan- gen Stielen	grau, fein fieder- schnittig	verholzender Halbstrauch	3
<b>S a p o n a r i a</b> (Seifenkraut)	x lempergii 'Max Frei'	So/trocken, durchlässig	30	VIII-IX	rosa, duftend!	lanzettlich, graugrün, glatt	horstartig wachsend, nie- derliegende, aufstrebende verzweigte Triebe	3
	officinalis 'Plena'	So-Hs/trocken- frisch	80	VI-IX	rosa gefüllt, doldenartig	lanzettlich	kriechendes Rhizom, nie- derliegende aufsteigende Triebe	3
	sicula var. intermedia	So/mineralisch	30	VIII-IX	frischrosa in Trugdolden	lanzettlich	Triebe niederliegend	3
<b>S a t u r e j a</b> (Bohnenkraut)	montana ssp. montana	So/trocken, ma- ger, kalkliebend	30	VIII-IX	weiß in dichten Schein- quirlen, aromatisch	dunkelgrün, schmal und kurz	Halbstrauch	3
<b>S a x i f r a g a</b> (Steinbrech)	x arendsii	Hs/frisch, humos	15	V	rosa oder rot, mehrere Blütchen an kurzen Stängeln	sattgrün, fiederlappig	moosartige Polster	2
	paniculata	So/anspruchslos	15	V-VI	weiße Rispen	hell graugrün, in Ro- setten	bildet Rosettenteppeche	3
	rotundifolia	Hs/frisch	50	VI-VII	gelblich weiß, in locke- ren Rispen	hellgrün, langgestielt, rundlich	horstige wintergrüne Stau- de	3
	x urbium 'Aureopunc- tata'	Hs/trocken-frisch	30	V-VI	rosa Rispen	in Rosetten, gelb ge- fleckt	wintergrün	3
<b>S c a b i o s a</b> (Skabiose)	canescens	So/eher trocken, sandig - lehmig	30	VII-X	hellblau, langgestielt	ganzrandig oder fie- derteilig	Pionierpflanze in Trocken- und Steppenrasen	2
	japonica	So/anspruchslos	40	VI-VIII	blau, gestielt	fiedrig geteilt	kurzlebig, Selbstaussaat	2
	ochroleuca	So/trocken, nähr- stoffreich	80	VI-X	hellgelb, zahlreich, ge- stielt	hellgrün, fiederspaltig	sehr ausladend durch rei- che Verzweigung, Selbst- aussaat	2
<b>S e d u m</b> (Fetthenne)		So/trocken, durchlässig	10 bis 60	VI-IX	mehr oder weniger gro- ße Trugdolden	wasserspeichernd mit wachsartiger Oberflä- che		
	cauticola			VIII-IX	karminrot	blaugrau	Wuchs eher liegend, Stän- gel rötlich	1

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
S e d u m	cauticola 'Robustum'		20	IX	karminrot		zierlich, aufrecht	1
	floriferum 'Weihenstephaner Gold'		15	VII	gelb	grün mit rötlichen Trieben	langsam kriechender idealer Bodendecker	1
	rupestre 'Angelina'			VII	gelb	leuchtend gelb	niederliegend	1
	spectabile 'Stardust'	nährstoffreich	40	VIII	weiß, flach	hellgrün bis grau	aufrecht	3
	spurium 'Fuldaglut'		15	VII	weiß bis rosa	rot	flach	1
	telephium x 'Herbstfreude'	nährstoffreich	60	IX	rostrote Blüten dolden	grün	bildet gut stehende große Büsche, auch im Winter attraktiv	3
	Hybride 'Matrona'	nährstoffreich	50	VIII	rosa	violettgrün	aufrecht	3
<b>S e m p e r v i v u m (Dachwurz)</b>	Hybriden	So/trocken, mager	10	VII	meistend rosa auf 20 cm hohen Stängeln	grün, rot, grau oder weißwollig behaart	dickblättrige Rosettenstauden, die sich durch Tochterrosetten ausbreiten	1
<b>S e n e c i o (Greiskraut)</b>	doria	So/frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	gelb, verzweigter endständiger Blütenschirm	dunkelgrün, elliptisch	Stängel aufrecht, kurze Ausläufer	5
<b>S e r r a t u l a (Färberscharte)</b>	tinctoria	So-Hs/durchlässig, mittelschwerer Boden	100	VII-VIII	violett, ähneln Kornblumen, in doldiger Rispe	lanzettlich oder fiederschnittig	horstig wachsend	3
<b>S e s e l i (Bergfenchel)</b>	montanum	So/trocken, durchlässig	50	VII-IX	weißrosa in Dolden	fein zerteilt	aromatisch, relativ langlebig	3
<b>S i d a (Virginiamalve)</b>	hermaphrodita	So/anspruchlos	250	VI-X	weiß, in Büscheln aus den Blattachsel	3- bis 7-lappig	stark verzweigte dicke Stängel, Ausläufer	5
<b>S i l e n e (Leimkraut)</b>	dioica	So-Hs/liebt Stickstoff	80	V-VIII	purpurrot, klein	oval, zugespitzt, behaart	aus Grundrosette wachsen mehrere beblätterte Stängel	2
	maritima	So/trocken, anspruchslos	15	VI-VII	weiß mit aufgeblasenem Kelch	graugrün, elliptisch, kurz	bildet kleine Polster	2
<b>S i l p h i u m (Harzkraut)</b>	integrifolium	So/trocken-frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	gelbe Korbblüten, Blütenstand verzweigt	dunkelgrün, rau, gegenständig	horstartig wachsend, wenig standfest	5
	mohrii	So/eher trocken	100	VII-IX	hellgelbe Korbblüten	ganzrandig, hellgrün behaart	horstig, interessante Neueinführung	3

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5 = 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,



Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
Silphium	perfoliatum ( <b>Becherpflanze</b> )	So/frisch-trocken, nährstoffreich	250	VII-IX	gelbe Korbblüten, verzweigter Blütenstand	groß, gezähnt, gegenständig angeordnet, so dass sich eine Art Becher bildet	Stängel kräftig vierkantig, ziemlich standfest	5
<b>Solidago (Goldrute)</b>	caesia	So/frisch, nährstoffreich	70	VIII-IX	gelb, zu mehreren in den Blattachseln	schmal, dunkelgrün	sehr dicht wachsend, bräunliche Stängel	3
	rugosa	So/frisch, nährstoffreich	120	VIII-IX	heller gelb, horizontal verzweigt	rötlich grüne Blätter und Stängel	kurze Ausläufer	5
	sempervirens `Goldene Wellen`	So/trocken-frisch, nährstoffreich	120	X	gelbe Rispen, gebogen	dunkelgrün, schmal, glänzend	horstartig	3
	speciosa	So/trocken-frisch, anspruchslos	80	IX	gelbe Rispen, aufrecht	breit-oval	horstig wachsend	3
	virgaurea	So-Hs/trocken, mager	120	VII-IX	gelbe Blüten in Knäulen aus den Blattachsen entspringend	breit lanzettlich, grob gesägt	horstig wachsend, Selbstausaat	3
	Hybride 'Loysden Crown'	So/trocken-frisch	80	VII-VIII	hellgelbe Rispen	lanzettlich	horstartig	3
	Hybride 'Strahlenkrone'	So/trocken-frisch	60	VII	sattgelbe Rispen	lanzettlich, am Rand gesägt	horstartig	3
<b>Stachys (Ziest)</b>	byzantina	So/trocken, mager, durchlässig	40	VI-VII	violett, unscheinbar an stark behaarten Stängeln	dicht graufilzig, breit-oval	kriechendes Rhizom, Selbstausaat	3
	byzantina `Helene von Stein`	So/trocken, mager	40	VI-VII	wenig blühend	graugrün behaart, breiter als bei S. byzantina	leicht kriechend, wenig wintergrün, aber früh austreibend	3
	discolor	So/trocken-frisch	40	VII	weiße Blütenähren	hellgrün, gerunzelt	locker horstig, anspruchslos	3
	macrantha	So/eher frisch, nährstoffreich	50	VI	violett, Einzelblüten relativ groß, in Quirlen übereinander	herzförmig, breit gekerbt, runzlig	mattenartiger Wuchs	3
	officinalis	So/trocken-frisch	50	VII-VIII	dunkelrosa oder hellrosa, kurze Ähren	hellgrün, langgestielt, gerunzelt	horstartig	3

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
Stachys	recta 'Sylvia'	So/trocken	40	VII-IX	fast weiß in lockeren Quirlen	dunkelgrün, lanzettlich, rel. kurz, gekerbt	horstartig, etwas unordentlich wachsend, sehr lange blühend	3
<b>Stellaria (Miere)</b>	holostea	Hs/mäßig nährstoffreich	30	IV-VI	weiß, zahlreich	schmal lanzettlich, hellgrün	flächig wachsende lagern-de Triebe	3
<b>Succisa (Teufelsabbiss)</b>	pratensis	So/humos, mager, wechselfeucht	100	VII-IX	blaue halbkugelige Köpfchen	Grundblätter in wintergrüner Rosette	Stängel verzweigt, Selbstausaat	3
<b>Succisella (Moorabbiss)</b>	inflexa	So/wechselfeucht, kalkarm	80	VII-IX	weiß bis hell-lila	relativ lang, breit-lanzettlich	vieltriebig, Wurzelstock mit Ausläufern	3
<b>Symphytum (Beinwell)</b>	azureum	So-Hs/frisch-trocken	60	IV-V	himmelblau, klein, röhrig, verzweigter Blütenstand	bläulich-grün, gerunzelt, breit-oval	stark riechendes Rhizom	3
	grandiflorum	Hs/anspruchlos	20	V	hellgelbe Glöckchen	dunkelgrün, rau	kurze Ausläufer	3
	x uplandicum	So-Hs/eher frisch	100	VI-VIII	mattviolett oder rosarot	grün, breit-oval, rau	sehr üppige Stauden	5
<b>Tanacetum (Margerite)</b>	corymbosum	So/eher trocken, mager, kalkhaltig	80	VI-VII	weiße Margeritenblütchen in Sträußen	fein zerteilt	horstig	3
	macrophyllum	Hs-So/anspruchlos	100	VI-VII	weiß, schafgarbenähnlich	graugrün, fiederteilig, gesägt	horstig wachsend	3
	parthenium (Mutterkraut)	So-Hs/anspruchlos, eher trocken	40	VI-IX	weiß, lockerer Blütenstand	hellgrün, mehrfach gefiedert, aromatisch	Selbstaussaat	2
	vulgare 'Crispum' (Rainfarn)	So/anspruchlos	80	VII-IX	gelbe Knöpfe in dicht stehender Dolde	dunkelgrün, fein geteilt, kraus	Ruderalpflanze, kurze Ausläufer	3
<b>Telekia (Ochsenauge)</b>	speciosa	So-Hs/frisch, nährstoffreich	120	VI-VII	gelb, feinstrahlig, gestielt	hellgrün, gesägt, breit herzförmig, zugespitzt	Solitärstaude, Stängel kräftig, oben verzweigt	3
<b>Tellima (Falsche Alraunwurzel)</b>	grandiflora	Hs-So/trockenfrisch, mäßig nährstoffreich	20/50	V-VI	helle unscheinbare Blütchen an langen Stielen, duften	wintergrüne Rosette, Blätter gestielt, behaart, rundlich gelappt	anspruchloser Bodendecker, Selbstausaat	2
<b>Teucrium (Gamander)</b>	chamaedrys	So/trocken, kalkliebend	30	VII-VIII	weiße Lippenblütchen in Quirlen übereinander	dunkelgrün, gesägt, klein	oft immergrün, Ausläufer	3
Teucrium	hircanicum	So-Hs/anspruch-	40	VII-X	Blütchen in rotpurpur-	oval zugespitzt und	horstig, eigentlich von	2

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
		los			nen Ähren	runzlig	feuchten Standorten stammend	
	x lucidrys	So/trocken, kalkliebend	40	VII-VIII	karminrosa, achselständige Blütenquirle	dunkelgrün, ledrig	immergrüner Halbstrauch	3
	scorodonia <b>(Salbei-Gamander)</b>	Hs-So/eher trocken, sauer	70	VII-IX	hellgelb aus den Blattachseln, endständig	runzlig herzförmig	kurze Ausläufer, Triebe mehr oder weniger aufrecht, dicht beblättert	2
<b>Thalictrum (Wiesenraute)</b>	aquilegifolium	So/frisch, nährstoffreich	100	V-VI	lilarosa oder weiß, Dol-denrispen, wirken flauschig	akelei-ähnlich	Stängel aufrecht, horstig	3
	delavayi	So/frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	zartlila, große Blütenrispe	zart mehrfach gefiedert	Stängel dunkel getönt, oben gebogen, Selbstaus-saat	4
	flavum ssp. glaucum	So/trocken-frisch	180	VI-VII	hellgelb, Blütenrispe flauschig, duftend	blaugrün, mehrfach gefiedert	horstig, aufrecht	3
	lucidum	So/frisch, nährstoffreich	180	VI-VII	gelbliche Blütenrispe	glänzend, fein geteilt	horstig, weniger gut stehend	3
	polyganum	So/frisch, nährstoffreich	120	VII-VIII	weiße Blütenrispe	grün, mehrfach geteilt	horstig, standfest	3
<b>Thermopsis (Fuchsbohne)</b>	lanceolata	So/trocken-frisch, mineralisch	70	VI-VII	gelb, endständige Traube	dunkelgrün, oval-lanzettlich	lupinenähnliche horstartig wachsende Staude	3
<b>Thymus (Thymian)</b>	pseudolanuginosus	So/trocken, mager	5	VI-VII	rosa	behaart, klein	bildet eine dichte Matte	3
	serpyllum 'Coccineus'	So/trocken, mager	5	VI-VII	lilarosa	klein, dicht aneinander	schöne dichte Polster	3
	vulgaris	So/mager, trocken	20	VI-VII	hell-lila	dunkelgrün, schmal, kurz	kleine, immergrüne aromatische Sträucher	3
	x citriodorus Typ Lam-mefjord	So/mager, trocken	10	VI-VII	karminrosa	kurz	wüchsige, kriechende Sorte	3
<b>Trifolium (Klee)</b>	ochroleucon	So/anspruchlos	50	VI-VII	hellgelbin gedrängten Köpfen	hellgrün, breit-oval, behaart	horstartig	3

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
Trifolium	rubens ( <b>Purpurklee</b> )	So/anspruchlos, lehmig	30	VI-VII	rot, walzenförmig	dunkelgrün, dreiteilig	horstartig, tief wurzelnd	3
<b>Trollius (Trollblume)</b>	europaeus	So/frisch	50	V-VI	gelb, kugelig	langgestielte dreilappige Grundblätter	anspruchsvoll, Feuchtwiesenpflanze	4
	chinensis	So/feucht, nährstoffreich	40	VI-VII	orange, offene Schalen	handförmig geteilt	anspruchsvoll, Feuchtwiesenpflanze	4
<b>Uvularia (Trauerlocke)</b>	grandiflora	Hs/nährstoffreich	60	V-VI	gelb, hängende Glocken	breit lanzettlich	kurze Ausläufer, langsam wachsend	6
<b>Valeriana (Baldrian)</b>	alliariifolia	So-Hs/frisch	90	VI-VII	rosaweiß	hellgrün, breit herzförmig, zugespitzt	horstig	3
	officinalis	So/frisch, nährstoffreich, kalkliebend	180	VI-VIII	weiß, Trugdolde	dunkelgrün, unpaarig gefiedert,	aufrechte Stängel, Selbstausaat, duftend!	2
<b>Verbascum (Königskerze)</b>	nigrum 'Album'	So/trocken	100	VI-VIII	weiß, zahlreich, in den Blattachsen entlang des Stängels	Grundrosette dunkelgrüner länglicher Blätter	langlebig	3
	phoeniceum	So/eher trocken	50	V-VII	rosalila, einzeln in den oberen Blattachsen	flache Rosette dunkelgrüner Blätter	zierliche Staude	2
<b>Verbena (Eisenkraut)</b>	bonariensis	So-Hs/trockenfrisch, mäßig nährstoffreich	120	VIII-X	violettblau, Blüten in kleiner Dolde	dunkelgrün, schmal, am Rand gekerbt	sparriger Wuchs, ganze Pflanze rau, <u>einjährig!</u> Selbstausaat	2
	hastata	So/mäßig frisch	100	VII-IX	violettrosa, rosa oder weiß, endständig in zahlreichen schmalen Ähren	lanzettlich	ausdauernd, aufrechte Staude	2
<b>Vernonia (Vernonie)</b>	fasciculata	So/eher frisch, nährstoffreich	180	VIII-IX	tief violett, breite Scheindolde	violett-grün, lanzettlich, lang	spät austreibend, aufrechte violett-grüne Stängel	3
<b>Veronica (Ehrenpreis)</b>	gentianoides	So-Hs/eher frisch, mäßig nährstoffreich	40	V	hellblau, in langen Trauben	glänzend, breit oval	kriechendes Rhizom	3
	longifolia	So/frisch-trocken, nährstoffreich	80	VII	blau oder weiß, endständige Ähren	graugrün, scharf gesägt	horstartig, Selbstausaat	2

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
Veronica	prostrata	So/trocken, sandig-lehmig	10	V-VI	blau, kurze Blütenähren	dunkelgrün, kurz	dicht beblätterte niederliegende Sprosse	3
	teucrium	So/mäßig trocken, kalkliebend	40	V-VI	dunkelblau, kurze Blütentrauben	grob gesägt, klein	eher horstig	3
<b>Veronicastrum (Hoher Ehrenpreis)</b>	sachalinense	So/nährstoffreich	160	VI	blaue Blütchen in langer Ähre	breit lanzettlich, quirlständig	horstig, gut stehend	3
	sibiricum	So/frisch, nährstoffreich	100	VI-VII	violett, Blütenähren dicht, eine längere endständige, darunter mehrere kürzere in Quirlen	breit lanzettlich, quirlständig	kurze Ausläufer, standfest	5
	virginicum	So-Hs/nicht zu trocken, nährstoffreich	160	VII-VIII	weiß, rosa oder lila, viele end- und achselständige Ähren	in Quirlen, lanzettlich	sehr gerade Stängel	4
<b>Vinca (Immergrün)</b>	balcanica	Hs/anspruchlos, durchlässig	30	IV-VI	tief violettblau, Blütenblätter mit Zwischenraum	dunkelgrün, glänzend	niederliegende etwa 80 cm lange Triebe	2
	minor	Hs/anspruchlos	20	IV-V	blau, weiß oder violettrot	dunkelgrün, glänzend, schmal-oval	ober- und unterirdische Ausläufer	2
<b>Vincetoxium (Schwalbenwurz)</b>	hirundinaria	So-Hs/mäßig trocken, etwas lehmig	80	VI-IX	weiß, klein aus den Blattachsen	breit-oval, spitz	bogig überhängende dünne Triebe, tief wurzelnd	3
<b>Waldsteinia (Golderdbeere)</b>	geoides	Hs/mäßig frisch	25	IV-V	gelbe Erdbeerblüten, zu mehreren über dem Laub	hellgrün, gestielt, rundlich, etwas geteilt, rau	wintergrüne Staude mit kurzen Ausläufern	3
	ternata	Hs/eher frisch	15	IV-V	gelb, Blütenstände bis 7-blütig	dunkelgrün, glänzend, dreiteilig	ober- und unterirdische Ausläufer	3
<b>Gräser</b>								
<b>Andropogon (Blauhalm)</b>	gerardii	So/mäßig trocken	180	IX	büschelige Federn mit ährigen Hauptästen	blaugrün, weich, schmal	elegant aufrecht horstartiges Gras, sommergrün	4
<b>Bouteloua (Moskitogras)</b>	gracilis	So/trocken, nährstoffreich	40	VII-IX	waagerechte kurze braune Scheinähren	schmal, rau	horstiges Gras für artenreiche Pflanzungen	3

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blütezeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preisgruppe
<b>B r i z a</b> (Zittergras)	media	So/trocken, mager	50	V-VII	Ährchen herzförmig hängend	grün, weich, schmal	lockerhorstig	3
<b>C a l a m a g r o s t i s</b> (Reitgras)	x acutiflora `Karl Foerster`	So/nicht zu trocken, anspruchslos	170	VI-VII	Blütenhalme straff aufrecht mit endständigen Rispen	weich	früh grünende Horste	3
	x acutiflora 'Overdam'	So/nicht zu trocken	150	VI-VII	Blütenhalme straff aufrecht mit endständigen Rispen	längs weiß gestreift	früh grünende Horste	3
	brachytricha	So/relativ trocken	100	IX	fein verzweigte Blütenrispen	grün, schmal, weich	horstig wachsend und früh grünend	3
<b>C a r e x</b> (Segge)	conica 'Variegata'	Hs/anspruchslos	20	IV-VI	Blütenähren schmal und kurz, über dem Laub	grün, weißgerandet, schmal	immergrüne kleine Horste, Schutz vor Kahlfrösten	3
	eburnea	So-Hs/trocken	15	V	strohige Ähren	hellgrün, nadelförmig	horstig, immergrün	3
	grayi (Morgensternsegge)	So/frisch	60	VI-IX	weibliche Ähren sehen aus wie mittelalterlicher „Morgenstern“	5-9 mm breit, deutlich gekielt	horstig wachsend	3
	montana (Bergsegge)	So-Hs/Lehm, Kalk Wärme liebend	15	III-V	schmale kurze Ähren über dem Laub	hellgrün, weich, überhängend, braunrote Herbstfärbung	sommergrüne Horste	3
	morrowii 'Aureovariegata'	Hs/anspruchslos	30	V	Blütenähren schwarz, kurz	gelblich gerandet, scharf gekielt	immergrüne Horste, Schutz vor Kahlfrösten!	3
	morrowii 'Variegata'	Hs/eher trocken	30	V	Blütenähren schwarz	schwach weiß gerandet	immergrüne Horste, Schutz vor Kahlfrösten	3
	muskingumensis (Palmwedel-Segge)	So-Hs/frisch, humos	60	VI-VIII	in zahlreichen Ähren	hellgrün, schmal in Wedeln übereinander	lockerhorstig	3
	ornithopoda 'Variegata' (Vogelfuß-Segge)	Hs/kalkliebend, locker, humos, warm	15	V-VI	Blütenstand ähnelt Vogelfuß	gelbgrün gestreift	kleine immergrüne Horste, Schutz vor Kahlfrösten	3
	oshimensis 'Evergold'	Hs/trocken	40	VI	kurze helle Ähren	gelb gestreift	immergrün, Schutz vor Kahlfrösten	4
	plantaginea	Hs/trocken-frisch	20	IV-VI	kurze dunkle Ähren	breit, gefaltet wirkend, weich	immergrün, horstig	3

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blüte- zeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preis- gruppe
<b>C h a s m a n t h i- u m</b> (Plattährengras)	latifolium	So-Hs/eher frisch	80	VIII	viele plattgedrückte Ährchen, rispig, überhängend	breit, weich, Halme bis oben beblättert	horstartig, auch im Winter dekorativ, sommergrün	4
<b>D e s c h a m p s i a</b> (Schmiele)	cespitosa	So-Hs/frisch	70	VI-VII	lockere, dunkel getönte Blütenrispen, deutlich über dem Laub	dunkelgrün, schmal, rau	dichte halbkugelige Blattrhorste	3
<b>E r a g r o s t i s</b> (Liebesgras)	trichodes	So/trocken, warm, nährstoffreich	80	VIII-IX	lockere duftige Rispe	grün, schmal, weich	horstartiges Gras	3
<b>F e s t u c a</b> (Schwingel)	gautieri ssp. scoparia (Bärenfellschwingel)	So-Hs/trocken, mager	10	VI-VII	unscheinbar strohig	grün, stachelig, nadelig	breite Polster	3
	glauca 'Elijah Blue' (Blauschwingel)	So/trocken, mager, durchlässig	20	VII	strohige Ährchen über dem Laub	stahlblau, schmal	bildet Horste	3
	mairei (Atlasschwingel)	So/mineralisch	60	VI	lange Blütenhalme mit kurzen Rispen	graugrün, Ränder scharf gesägt	großes Horstgras	3
<b>H a k o n e c h l o a</b> (Jap. Waldgras)	macra	Hs/frisch, nährstoffreich	40	VIII-X	lockere lange Rispen	ca. 1 cm breit, lang und weich	lockerhorstig, sommergrün	5
<b>H e l i c t r o t r i c h o n</b> (Blaustrahlhafer)	sempervirens	So/trocken, fruchtbar, Kalk	40, 100	VI	Blütenrispen weit über dem Laub	silbergrau, lang und schmal	immergrüne Horste	4
<b>I m p e r a t a</b> (Alang-Alang-Gras)	cylindrica 'Red Baron'	so/warm, frisch	30			rot getönt, aufrecht, weich	lockere Horste	4
<b>K o e l e r i a</b> (Schillergras)	glauca	So/basenreich, mager	40	VI-VII	strohige schmale Rispen über dem Laub	blaugrün, relativ kurz,	bildet Horste, lange gut stehend	3
<b>L e y m u s</b> (Strand-Roggen)	arenarius	So/mager	80	VI-VIII	lange Ähre, strohfarben	intensiv blau	lange Rhizome, am besten mit großem Topf pflanzen	4
<b>L u z u l a</b> (Marbel)	nivea (Schnee-Marbel)	Hs/frisch, lehmig, humos	50	VII-VIII	weißlich, im Büschel über dem Laub	grün, hell behaart, am Rand bewimpert	immergrüner Horst	3
	pilosa 'Igel'	Hs/frisch, humos	10, 20	IV-V	braun in Büscheln	dunkelgrün, schmal, glänzend, am Rand bewimpert	dichte immergrüne Büschel	3
	sylvatica (Wald-Marbel)	Hs/trocken-frisch	20/60	IV-VI	braune Spirre weit über dem Laub	breit, weich, am Rand bewimpert	kahlfrostempfindlich, wintergrün, lockerhorstig	3

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5 = 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,

Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blüte- zeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preis- gruppe
L u z u l a	sylvatica 'Marginata'	Hs/trocken-frisch	20/40	IV-VI	braune Spirre über dem Laub	grün mit schmalem gelben Rand	lockerhorstig, wintergrün	3
<b>M i s c a n t h u s</b> (Chinaschilf)	x giganteus	So/warm, frisch, mäßig nährstoffreich	250			breit, etwas hängend, Halme beblättert	sehr aufrecht stehende Halme, kurze kräftige Rhizome	7
	sinensis in Sorten	So/nicht zu trocken, mäßig nährstoffreich	80 bis 200	VIII-X	silbrig oder rötlich, schilfartig	meistens weißer Strich in der Blattmitte, scharfkantig	horstartig, Halme breiter oder schmaler belaubt, gut stehend im Winter	5
<b>M o l i n i a</b> (Pfeifengras)	arundinacea 'Transparent'	So/frisch, lehmig	200	ab VII	sehr lange, eher breite Rispe	weich, überhängend	dichter, sommergrüner Horst, standfest bis zum Winteranfang	5
	arundinacea 'Windspiel'	So/frisch, lehmig	bis 220	ab VII	sehr lange eher schmale Rispe	weich, überhängend	dichter sommergrüner Horst	5
	caerulea in Sorten	So/frisch, sandig-lehmig	60 bis 100	ab VII	Rispen über dem Laub	weich, leicht überhängend, schöne Herbstfärbung	sommergrüne Horste, auch im Winter standfest	4
<b>P a n i c u m</b> (Rutenhirse)	virgatum in Sorten	So/frisch, warm, nährstoffreich	120	ab VII	Blütenstand locker rispig breit und kurz über dem Laub		kurze Ausläufer, steil aufrechte beblätterte Halme, standfest im Winter	
	virgatum 'Heavy Metal'		100			blau bereift		4
	virgatum 'Shenandoah'		100			rötliche Blattspitzen		4
	virgatum 'Strictum'		150			graugrün		4
<b>P e n n i s e t u m</b> (Lampenputzergras)	alopecuroides 'Compressum'	So/mäßig frisch, nährstoffreich, warm!	70	ab VIII	endständige Blütenwalzen	scharf gekielt, spät austreibend, überhängend	sommergrün, Rückschnitt im Frühjahr, horstig wachsend	4
<b>S c h i z a c h y r i u m</b> (Prärie-Bartgras)	scoparium	So/nicht zu trocken, mäßig nährstoffreich	60	ab VIII	traubiger Blütenstand	grünlich-bläulich-purpurfarben, schmal und weich	horstiges Gras, spät austreibend	4
<b>S e s l e r i a</b> (Kopfgras)	autumnalis	So/trocken, mineralisch, kalkliebend	40	VIII-IX	strohgelbe walzenförmige Rispe über dem Laub	hellgrün, schmal	locker - horstig	3
	caerulea	So/trocken-frisch,	20	V	gedrängte Köpfchen	blaugrün	halbwegs immergrün	3

Preisgruppen: 1= 2,00 €, 2= 2,50 €, 3= 3,00 €, 4=3,50 €, 5 = 4,00 €, 6= 4,50 €, 7= 5,00 €, 8= 6,00 €, 9= 7,00, 10= 13,00 €

Zeichenerklärung: So-Sonne, Hs-Halbschatten, S-Schatten,



Gattung	Art, Sorte	Standort	Höhe cm	Blüte- zeit	Blüten	Blätter	besondere Merkmale	Preis- gruppe
<i>Sesleria</i>	heufferiana	So-Hs/frisch, kalkliebend	50	III-IV	in Köpfchen, schwarz mit auffälligen gelben Staubbeuteln	grün, oberseits silbrig bereift	Horstgras mit kurzen Aus- läufern	3
	nitida	So/durchlässig, humos, kalklie- bend	80	ab V	in Köpfchen auf langen Stielen	relativ breit, bläulich, spitz	horstig wachsend	4
<b>Sorghastrum (Goldbartgras)</b>	nutans	So/warm, frisch	100	IX	attraktive gelbe Staub- gefäße zur Blütezeit	grüne schmale wei- che Blätter	horstartig	4
<b>Spartina (Seilgras)</b>	pectinata 'Aureovariegata'	So-Hs/anspruch- los	120	IX-X	Blütenstand aus einsei- tig ährigen Ästen	gelb gesäumte Blätter	Ausläufer	3
<b>Spodiopogon (Zotten-Rauhgras)</b>	sibiricus	So/mäßig frisch	100	ab VII	Blütenrispen kurz über dem Laub, eiförmig	relativ weich mit wei- ßem Mittelstreifen, stehen beinahe waa- gerecht ab	sommergrünes lockerhors- tiges Gras, Halme beblät- tert	3
<b>Sporobolus (Tautropfen-Gras)</b>	airoides	So/trocken, fruchtbar	60	VI-VIII	Blütenrispen voluminös, bräunlich	weich, schmal	horstig, noch in der Erpro- bung	3
	heterolepis	So/trocken, mäßig nährstoffreich	70	ab VIII	lockere duftende Blüten- rispen, weit über dem Laub	grün, fein überhän- gend	horstartig, kugelige Gestalt	3
<b>Stipa (Federgras)</b>	calamagrostis (Silber-Raugras)	So/trocken, warm	80	VI-X	vielblütige Rispen, er- scheinen über einen langen Zeitraum	grün, weich	horstig wachsend , elegan- tes, früh grünendes Gras	3
	pennata	So/trocken, warm, mineralisch	40	VI	Rispen mit langen Gran- nen	sehr schmal, grün	zierliches Federgras, Selbstaussaat	3
	pulcherrima forma nu- dicostata (Reiher-Federgras)	So/trocken, warm, mineralisch	80	VII	zur Blütezeit sehr auffäl- lig durch lange Grannen	blaugrau, schmal	horstartig, manchmal kurz- lebig	3

